



総合かぜ薬

**新ストナエスG**

新ストナエスGは…

11の症状に効く

- かぜの熱、せき、のどの痛み、鼻水、鼻づまりなどを緩和する総合かぜ薬です。



## 使用上の注意

## ❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下



まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

### 【効能】

かぜの諸症状(発熱、せき、鼻づまり、鼻水、たん、頭痛、悪寒、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み、のどの痛み)の緩和

### 【用法・用量】

下記の1回服用量を食後なるべく30分以内に服用します。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
11～14才	2/3包	
7～10才	1/2包	
3～6才	1/3包	
1～2才	1/4包	
1才未満	服用しないでください	

### 【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。

### 【成分・分量と働き】3包中(1包1.2g)

成分	分量	働き
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状を抑えます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきの中枢に作用して、せきを鎮めます。
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	
グアヤコールスルホン酸カリウム	150mg	たんをうすめて出しやすくします。
チンピ末	300mg	かぜの諸症状を緩和します。
ショウキョウ末	100mg	
リボフラビン	6mg	かぜの時に消耗しやすいビタミンを補給します。
無水カフェイン	75mg	熱や痛みをとる成分の働きを高めます。

添加物として、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、アスパルテム(L-フェニルアラニン化合物)、l-メントール、香料(アルコールを含む)を含有します。

### ◎保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- 配置期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。



### ◎早くよくなっていただくためのアドバイス

- 睡眠をとり無理をしないことが治療の第一歩。特に熱がある時、せきが出る時には、できるかぎり仕事や家事を休み、床につきましょう。
- 衣服や寝具は体をあたたかく保てるものを。もちろん部屋もあたたため、なるべく湯気をたてて空気の乾燥を防ぎましょう。
- 汗をかいたらタオルでふいて、下着をとりかえ、体を冷やさないようしましょう。
- 食事はあたたかいもの、水分やビタミンの多いもの、カロリーの高いもの、消化のよいものを取りましょう。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
http://www.pmda.go.jp/ikenkouhigai\_camp/index.html  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間: 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号