

# 私の漢方薬



吸湿しやすいため、開封後は服用のつどチャックをしっかりとしめること

キリトリ線

販売名：八味地黄丸料錠 T07

第2類医薬品

服用に際して、この説明文を必ずお読みください

## 使用上の注意

**× してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと (1) 胃腸の弱い人 (2) 下痢しやすい人

## 相対すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このハットマークを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、このハットマークを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること：下痢  
4. 1か月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このハットマークを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

**【禁忌・別薬】** 体液中中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷たやすく、尿量減少または多尿で、とくに口渇があるものの次の諸症：下腹痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭痛、耳鳴り)、軽い尿漏れ

**【用法・用量】** 次の量を1日3回食前または食間に、水または白湯さゆにて服用すること

年齢	1回量	1日服用回数	
		成人(15歳以上)	3回
5歳以上15歳未満	2錠	3回	
5歳未満	服用しないこと		

※食間とは、食後2～3時間を指し、まず＜用法および用量に関連する注意＞  
1. 用法・用量を厳守すること  
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

**【成分・分量】** 1日量(9錠)中

八味地黄丸エキス(1/2量)2200mg(シオウオウ 2.5g、サンジュウ 1.5g、サンヤク 1.5g、タクシヤ 1.5g、ゴウヨウ 1.5g、ホクサン 1.5g、クワンシ 0.5g、フスマ 0.5g)より抽出を含む。添加物としてCMC-Ca、二酸化チタン、クロスカムC-Na、タルク、ステアリン酸Mg、セルロー、ヒドロキシメチルセルロース、スクロース、カルナウ(ロウ)を含む

**【保管および取扱い上の注意】** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと (5) 本剤にぬれた手で触れないこと (6) 手にとった錠剤を元の袋に戻すと、他の錠剤に影響を与えることがあるので注意すること (7) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味または香り等が多少異なること  
かありますが、効果に差異はありません (8) 錠剤は服用しないこと

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
☎ 0120-149-931

発売元 株式会社 日本ヘルスケアアドバイザーズ



東京都豊島区西池袋3-27-12

製造番号

お問い合わせ先: 0120-009-642

SE-1

使用期限

受付時間: 9:00～17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

製造 中村薬品工業株式会社  
販売元 奈良県高市郡高取町大字丹生谷31-32

07



# 私の漢方薬

- ✓ 頻尿
- ✓ 夜間尿
- ✓ 軽い尿漏れ

## 八味地黄丸エキス錠

(はちみじおうがん)



第2類医薬品

270錠  
30日分

NHA

株式会社 日本ヘルスケアアドバイザーズ