

強心薬

和漢煉成

生薬製剤 救心

第2類医薬品

®登録商標

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。
 心臓は、血液を全身に循環させる生きたポンプで、この働きが悪くなると、からだの組織や器官は酸素欠乏の状態となり、いろいろな病気をひき起こすようになります。

どうきや息切れは、この生命の原動力ともいえる心臓の異常を知らせるサインです。生薬製剤救心は、八種の動植物生薬がそれぞれの特長を発揮してどうきや息切れにすぐれた効きめを現わします。

さらに、身体がだるくて気力が出ないようなくきや、頭がボーッとしたときの気つけにも効果を発揮します。

⚠️使用上の注意

❌ つかうなげなうな

「守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる」

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の強心薬

👤 相談する人

一、次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(一) 医師の治療を受けている人

(二) 妊婦または妊娠していると思われる人

二、服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| | |
|------|-----------|
| 関係部位 | 症状 |
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐 |

三、五〜六日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

【効能】どうき、息切れ、気つけ

【用法・用量】

朝夕および就寝前に水またはお湯で服用すること

| | | |
|-----------|---------|------|
| 年齢 | 一回量 | 服用回数 |
| 大人(十五才以上) | 二粒 | 一日三回 |
| 十五才未満 | 服用しないこと | |

口中にとどめたり、かんだりせず、水またはお湯で服用すること(口中にとどめたり、かんだりすると成分の性質上、舌や口中にしびれ感がしばらく残ります。)

【成分】六粒中に次の成分を含みます。

| 成分 | 分量 | 主な作用 |
|------|--------|---|
| 蟪酥 | 五 mg | 心筋の収縮力を高め、血液循環をよくします。また、余分な水分を排泄し、心臓の働きを助けます。 |
| 牛黄 | 三 mg | 末梢循環を改善し、心臓の働きを助けます。 |
| 鹿茸末 | 五 mg | 強壮作用により気力を高めます。 |
| 人参 | 二二 mg | 鎮静作用によりストレスなどからくる神経の緊張を和らげます。 |
| 羚羊角末 | 六 mg | |
| 真珠 | 七・五 mg | 気力や意識の減退を回復させます。 |
| 龍腦 | 二・七 mg | |
| 動物胆 | 六 mg | 消化器の働きをよくし、他の成分の吸収を助けます。 |

添加物としてパラベン、トウモロコシデンプン、寒梅粉、カルメロース、薬用炭を含みます。

【保管および取扱上の注意】

- (一) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (二) 小児の手の届かない所に保管すること
- (三) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (四) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

救心製薬株式会社
 東京都杉並区和田一丁目二十番七号

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または左記にお願いいたします。
 救心製薬株式会社 お客様相談室 電話 〇三―五三八五―三二二一(代表)
 【受付時間】 九時～十七時(土、日、祝日、弊社休業日を除く)