

私の漢方薬



キリトリ線

吸湿しやすいため、開封後は服用のつどチャックをしつかりしめること

販売名:加味逍遙散錠 T24

使用上の注意

相談すること

- 1次の人(医師)に服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
- (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦または妊娠していると思われる人 (3)胃腸の弱い人 (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 2服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この「ウツケー」を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
- 4.1か月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この「ウツケー」を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
間質性肺炎	長期服用により、腰痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 3服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この「ウツケー」を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること；下痢
- 4.1か月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この「ウツケー」を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果 体力中等度以下でのぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の滞症²⁾、不眠症²⁾、注)血の滞症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです

用法・用量 次の量を1日2回食前または食間に、水または白湯にて服用すること

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	2回
7歳以上15歳未満	4錠	
5歳以上7歳未満	3錠	

5歳未満 服用しないこと

成分・分量 1日量(10錠)中 加味逍遙散エキス(1/2量)2380mg(トウキ 1.5g、シヤクヤク 1.5g、ビヤクシユク 1.5g、フクリヨウ 1.5g、サイコ 1.5g、ホクソク 1.0g、サンシツ 1.0g、カンソク 0.75g、シヨクキヨク 0.25g、ハッカ 0.5gより抽出)を含む。添加物として、二酸化ケイ素、クロム酸Na、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、タルク、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メタクリル酸メチル、ポリビニルピロリドンを含む

保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管すること (2)小原の手の届かない所に保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないこと (5)本剤にぬれた手で触れないこと (6)手にとった錠剤を元の袋に戻すと、他の錠剤に影響を与えることがあるので注意すること (7)本剤は天然物を原料としているため、色調、味または香り等が多少異なることがあります (8)乾燥剤は服用しないでください、効果に差異はありません (9)乾燥剤は服用しないでください

発売元 株式会社 日本ヘルスケアプロバイザーズ

東京都豊島区西池袋3-27-12

お問い合わせ先:0120-009-642

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

製造 中村薬品工業株式会社

販売元 奈良県高市郡高取町大字丹生谷31-32



製造番号

SE-1

使用期限

副作増量検査制度のお問い合わせ先 0120-149-931

24



私の漢方薬

第2類医薬品
300錠
30日分

- ✓ 月経困難
- ✓ 不眠症
- ✓ 更年期障害

加味逍遙散エキス錠

【かみしょうぎん】



NHA

株式会社 日本ヘルスケアプロバイザーズ