

項目	内容
医薬品区分	一般用医薬品
薬効分類	かぜ薬(内用)
承認販売名	カゼルト顆粒 α
製品名	カゼルト顆粒 α
製品名(読み)	カゼルトカリユウアルファ
製品の特徴	
使用上の注意	<p>■してはいけないこと          [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用しないでください           <ol style="list-style-type: none"> <li>本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</li> <li>12歳未満の小児。*</li> </ol> </li> <li>本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください            他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</li> <li>服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください            (眠気等があらわれることがあります。)</li> <li>授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</li> <li>服用前後は飲酒しないでください</li> <li>長期連用しないでください</li> </ol> <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください           <ol style="list-style-type: none"> <li>医師又は歯科医師の治療を受けている人。</li> <li>妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>高齢者。</li> <li>薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>次の症状のある人。                高熱、排尿困難</li> <li>次の診断を受けた人。                甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</li> </ol> </li> <li>服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください            [関係部位：症状]            皮膚：発疹・発赤、かゆみ            消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振            精神神経系：めまい            泌尿器：排尿困難            その他：過度の体温低下</li> </ol> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。            [症状の名称：症状]            ショック(アナフィラキシー)：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。            皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。            肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。            腎障害：発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。            間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。</p>

	<p>ぜんそく:息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 呼吸抑制:息切れ、息苦しさ等があらわれる。</p> <p>3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘、口のかわき、眠気</p> <p>4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>																		
効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和																		
効能関連注意																			
用法・用量	<p>次の量を、食後なるべく30分以内に水又は白湯にて服用してください。</p> <p>[年齢:1 回量:1 日服用回数] 成人(15歳以上):1包:3回 12歳以上15歳未満:2/3包:3回 12歳未満:服用しないでください</p>																		
用法関連注意	<p>(1)用法・用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。</p>																		
成分量	<p>1日量(3包3.0g)中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>900mg</td> </tr> <tr> <td>マレイン酸カルビノキサミン</td> <td>7.5mg</td> </tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>24mg</td> </tr> <tr> <td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>60mg</td> </tr> <tr> <td>グアヤコールスルホン酸カリウム</td> <td>240mg</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>75mg</td> </tr> <tr> <td>ベンフォチアミン(ビタミンB<sub>1</sub>誘導体)</td> <td>24mg</td> </tr> <tr> <td>リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)</td> <td>12mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	アセトアミノフェン	900mg	マレイン酸カルビノキサミン	7.5mg	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg	無水カフェイン	75mg	ベンフォチアミン(ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)	24mg	リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	12mg
成分	分量																		
アセトアミノフェン	900mg																		
マレイン酸カルビノキサミン	7.5mg																		
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg																		
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg																		
グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg																		
無水カフェイン	75mg																		
ベンフォチアミン(ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)	24mg																		
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	12mg																		
添加物	グリチルリチン酸2K、部分アルファー化デンプン、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース																		
保管及び取扱い上の注意	<p>(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手のとどかない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。) (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。 (5)使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。</p>																		
消費者相談窓口	<p>問合せ先名:日本薬剤株式会社 問合せ先住所:富山市東中野町一丁目1番1号 問合せ先部署:お客様相談窓口 問合せ先 TEL:076-424-2239 問合せ先受付時間:月～金 9:00～17:00(祝日を除く) 上記以外の内容:</p>																		
製造販売会社	<p>日本薬剤株式会社 939-8086 富山県富山市東中野町1-1-1</p>																		
販売会社																			
剤形	散剤																		
リスク区分等	第「2」類医薬品																		