

私の漢方薬



4 589633 180076

お風呂やすいたため、開封後は服用のつどチャックをしつかりしめること

服用に際して、この説明文を必ずお読みください

第2類医薬品

販売名：桂枝茯苓丸粒錠 T25

使用上の注意

相談すること

- 1次の方は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この1週間程度を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起ることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のたるさ、食欲不振等があらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この1週間程度を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。下痢

4. 1か月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この1週間程度を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果 比較的体力があり、とせに下腹部痛、肩こり、頭痛、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症[※]、肩こり、めまい、頭痛、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹、皮膚炎、にきび

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです

用法・用量 次の量を1日2回食前または食間に、水または白湯にて服用すること

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	2回
7歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上7歳未満	1錠	

5歳未満 服用しないこと

成分・分量 1日量(6錠) 中 桂枝茯苓丸エキス(1/2量) 1150mg(ケイヒ 2.0g、アケビヨク 2.0g、ホトトギス 2.0g、トウモロコシ 2.0g、シヤクヤク 2.0g より抽出)を含む

添加物としてCMC-Na、クロソウCMC-Na、二酸化ケイ素、無水クエン酸、ステアリン酸Mg、タルク、セルロースを含む

保管および取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密封して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと (5) 本剤にめれた手で触れないこと (6) 手にこびった錠剤を元の袋に戻すと、他の錠剤に影響を与えることがあるので注意すること (7) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味または香り等が多少異なることがあります (8) 乾燥剤は服用しないこと

発売元 株式会社 日本ヘルスケアアドバイザーズ

東京都豊島区西池袋3-27-12

お問い合わせ先 0120-009-642

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

製造 中村薬品工業株式会社

販売元 奈良県高市郡高取町大字丹生台31-32



SE-1

使用期限

0120-149-931

製造番号

0120-149-931

0120-149-931

25



私の漢方薬

第2類医薬品

180錠
30日分

NHA

株式会社 日本ヘルスケアアドバイザーズ



- ✓ 月経痛
- ✓ 肩こり
- ✓ 更年期障害

桂枝茯苓丸エキス錠
【けいしぶくよりがん】