

より良い漢方を

生薬製剤

日の丸丹

内容量
180g

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
< 軟便、下痢 >
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、もたれ、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、整腸（便通を整える）、腹部膨満感、軟便、便秘

■ 用法・用量

1日3回食後に、湯又は水にて服用してください。

15才以上	1回量	20丸
8才以上15才未満	1回量	10丸
5才以上8才未満	1回量	6丸

3才以上5才未満	1回量	4丸
3才未満の乳幼児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量 (1日量60丸)中

日本薬局方 オウゴン	0.540g	日本薬局方 ニンジン	0.090g
日本薬局方 オウバク	0.780g	日本薬局方 ケツメイシ	1.500g
日本薬局方 オウレン	0.120g	日本薬局方 ゲンノショウコ	0.540g
日本薬局方 コウボク	0.540g	日本薬局方 エンゴサク	0.300g
日本薬局方 ソウジュツ	0.540g	日本薬局方 カンゾウ	0.360g
日本薬局方 ダイオウ	0.090g	添加物としてコメデンプン含有する	

<保管及び取扱い上の注意>

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天産物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5)本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを食べたりしないようご注意ください。

【発売元・お問合せ先】

日の丸漢方

京都市下京区室町通六条下ル
TEL 075-351-6810

【製造販売元】

株式会社栃本天海堂
大阪市北区末広町3番21号

製造番号 □□□□□□□□

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931