

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面及びチューブ底に記載)を過ぎた製品
は使用しないこと

第②類医薬品
鎮痒消炎薬

カブナース

販売名:カブナース

特徴

1. 尿パッド・尿ライナー・おむつ等による、かゆみ、湿疹、ヒリヒリ感を伴うかぶれを改善する塗り薬です
2. 炎症を抑えて、かゆみ、ヒリヒリ感を鎮めます
3. サラサラした塗り心地のジェルタイプです
(本剤はアルコールを含んでいるので、塗布時にしみる場合があります)

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
(2) 創傷面
(3) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)
2. 顔面には広範囲に使用しないこと
3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が広範囲の人 (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

かぶれ、かゆみ、あせも、湿疹、皮ふ炎、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください

＜用法・用量に関連する注意＞

(1)用法・用量を守ること (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (4)外用にのみ使用すること (5)薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと

成分・分量 100g 中

成分	分量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	炎症を抑え、かゆみ、赤み・はれを鎮めます
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	かゆみの発生を抑えます
リドカイン	0.5g	かゆみを素早く鎮めます
グリチルレチン酸	0.1g	赤み・はれを鎮めます
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	雑菌の発生を抑えます

添加物として、ヒプロメロース、ヒドロキシエチルセルロース、エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、ポリソルベート80、プロピレングリコール、二酸化ケイ素、pH調節剤を含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)火気に近づけないこと(エタノール含有物)

●プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座等)、化繊の衣類、木材(塗料塗り家具、床等)、皮革等に液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意する

火気厳禁 第2石油類 危険等級Ⅲ エタノール含有物 水溶性

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **東光薬品工業株式会社**

〒123-0865 東京都足立区新田2-16-23

MADE IN JAPAN 10174687