

**【使用上の注意】 相談すること**

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感
- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
- 3.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【効能】**

- 滋養強壮○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後
- ・食欲不振・栄養障害
- ・発熱性消耗性疾患
- ・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

**【用法・用量】**

- 成人(15才以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。
- 用法・用量を厳守してください。
  - 小児には服用させないでください。

ガラス：瓶  
金属：キャップ



**滋養強壮・** **第2類医薬品**  
**肉体疲労時の栄養補給に**

**アミノ酸成分**

# 5300

アスパラギン酸  
タウリン 3000mg  
インヨウカク

**100mL**  
**パサード5300VX**

**【成分・分量】 100mL中**

L-バリン60mg、L-ロイシン240mg、L-イソロイシン60mg、L-アルギニン塩酸塩300mg、L-リジン塩酸塩210mg、グリシン310mg、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物1000mg、タウリン3000mg、インヨウカク流エキス0.1mL、サンシュユ流エキス0.2mL、カルニチン塩化物120mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg（アルコール0.3mL以下）  
添加物：カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、スクラロース、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、グリセリン、プロピレングリコール

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製造販売元 **小林薬品工業株式会社**  
岐阜県岐阜市中區1丁目139番地

お客様相談室 電話:058-278-3933  
受付時間:10時~16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用  
期限  
製造  
番号

