

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痛・消炎パップ剤 第3類医薬品

ラパンスホット

【特徴】

- ラパンスホットは、鎮痛・消炎効果と温感作用をあわせもった鎮痛・消炎温感パップ剤です。
- ラパンスホットは、4種の有効成分(サリチル酸グリコール、 ϑ -メントール、d ϑ -カンフル、トウガラシエキス)の働きで、腰痛、肩こり、関節痛などによく効きます。
- ラパンスホットは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと

- (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【機能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1~2回貼付する。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)打撲(うちみ)、捻挫には、はがひいてから使用すること。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (5)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないこと。
- (6)本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないこと。
(強い刺激を感じることがあるので、少なくとも入浴の1時間前にはがし、入浴後は30分位してから使用すること。)
- (7)本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないこと。
- (8)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。
(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

【成分・分量】 膜体100g(1000cm^2)中

サリチル酸グリコール 0.5g d ϑ -カンフル 0.3g
 ϑ -メントール 0.2g トウガラシエキス 0.3g
(原生葉換算量 3.75g)

添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、プロピレングリコール、尿素、エデト酸Na、カオリン、pH調整剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【包 装】 24枚入 [6枚×4袋] (1枚 : 14cm×10cm)

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話 (0879) 25-2363

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



発 売 元
テイコクファルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元
帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

