

外用消炎鎮痛剤

販売名:コムレケア ヨコヨコ
External Anti-Inflammatory / Analgesic

第2類医薬品

【成分・分量】100g 中

フェルビナク.....3g
トコフェロール酢酸エステル.....0.5g
l-メントール.....6g
添加物としてジイソプロパノール
アミン、アジピン酸ジイソプロピル、
ミリスチン酸イソプロピル、BHT、
プロピレングリコール、硫酸Mg、
エタノールを含有する

【用法・用量】

1日2~4回、適量を患部に
塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 目に入らないように注意する
こと。万一、目に入った場合には、す
ぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医
の診療を受けること(2) 外用にの
み使用すること●塗布部位をラッ
プフィルム等の通気性の悪いもの
で覆わないこと●皮ふの特に弱い
方は、同じ所に続けて使用しないこ
と●ヒリヒリとした刺激が強い場合
は、石けんで洗い流すと緩和します

税 控除 対象

あつらいいな/をかたちにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

特 徴

- ① 消炎鎮痛成分フェルビナクが患部に浸透し、
足のつりなどの筋肉の痛みを鎮めます
- ② 血行促進成分トコフェロール酢酸エステルが、筋
肉の収縮による滞った患部の血流を改善します
- ③ l-メントール6%配合で、爽快な使い心地です
- ④ ニオイが気にならない無臭性です
- ⑤ 手が汚れず使い易い、ヨコヨコボトルです

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こし
たことがある人(2) ぜんそくを起こしたことがある人(3)
妊婦又は妊娠していると思われる人(4) 15才未満の小児

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等(2) 湿疹、かぶれ、傷口又は化膿している患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人(2) 薬などによりアレルギー
症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用
の可能性があるため、直ちに使用を中止
し、このパッケージを持って医師、薬剤師又
は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、 ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィ ラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦 しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合
は使用を中止し、このパッケージを持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用に際して、この説明書
きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよ
う大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面
及び容器底面に記載)を過
ぎた製品は使用しないこと

【効能・効果】

筋肉痛、捻挫、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・
手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テ
ニス肘など)、打撲、肩こりに伴う肩の痛み

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少
ない涼しい所(冷暗所)にキャップを
しっかりしめて立てて保管すること
(2) 小児の手の届かない所に保管す
ること(3) 他の容器に入れ替えない
こと(誤用の原因になったり品質が
変わる)(4) 使用期限をすぎた製品は
使用しないこと。なお、使用期限内で
あっても、開封後はなるべく速やかに
使用すること(5) 火気に近づけない
●キャップをしっかりしめないと液
がもれることがある●プラスチック製
品(眼鏡わく、くし、便座等)、化繊の衣類、
木材(塗料塗り家具、床等)、皮革等に
液がつくと損耗したり、シミになるこ
とがあるので注意すること●衣類に
付着した場合には、各衣類の洗濯表示
に従って、すみやかに洗うこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店
又はお客様相談室にお問い合わせします

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

火気厳禁 第一石油類 危険等級Ⅱ
エタノール含有物