

この添付文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要時に読めるよう本剤とともに保管してください。

かぜ薬 **フルセーフ** カプセル

第②類医薬品

かぜをひくと発熱、せき、鼻水など不快な症状のために気分がすぐれず、仕事や日常生活に差し支えるとともに、睡眠不足や体力の消耗をきたすことがありますので、適切な手当と養生が必要です。**フルセーフカプセル**は、3種類の解熱鎮痛成分をはじめ、鎮咳去痰剤、抗ヒスタミン剤、生薬、ビタミン等を配合したかぜ薬です。

⚠️ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
(3) 15歳未満の小児
(4) 出産予定日12週以内の妊婦
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
5. 服用前後は飲酒しないでください。
6. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人 高熱、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中・の痛み、過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜炎症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ (小膿疱) が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜ ん そ く	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再 生 不 良 性 貧 血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無 顆 粒 球 症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼 吸 抑 制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

成分・分量 1日量(6カプセル)中

成分	分量	はたらき
アスピリン	300mg	痛みをおさえ、熱を下げます。
エテンザミド	300mg	
アセトアミノフェン	540mg	せきをしずめます。
ジヒドロコデインリン酸塩	22mg	
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
d-クルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりをおさえます。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
リボフラビン	12mg	発熱で消耗するビタミンB ₂ を補います。
キョウ乾燥エキス(キョウ500mgに相当)	50mg	たんを切り、せきをしずめます。
ケイヒ末	100mg	発汗をうながし、おだやかに熱を下げます。

添加物として乳糖、無水ケイ酸、タルク、ヒプロメロース、酸化チタン、ラウリル硫酸Naを含有します。

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
15歳以上	2カプセル	3回
15歳未満	服用しないでください。	

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)本剤の取り出し方 右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部をおしだすを指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。
 日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口
 電話：0748-52-1232 受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）