熱で体がだるい、食欲がない

そんな時の

栄養補給

発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

新ビルトンリリコレプラス

ショウキョウエキス、カンゾウエキス、ニンジンエキス配合

第2類医薬品 30mL

販売名:新ビルトンリリコレプラス 第2類医薬品

⚠使用上の注意

☒ してはいけないこと
(ひらないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)長期連用しないこと

■ 相談すること **1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】1日量(30mL×2)中
タウリン2000mg、カンゾウエキス1000mg(原生薬カンゾウとして4000mg)、ショウキョウ流エキス1mL(原生薬ショウキョウとして1000mg)、ニンジンエキス60mg(原生薬ニンジンとして666mg)、ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、パンテノール30mg、活性型ビ酸、葉酸、アセスルファムK、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料

【効能・効果】
滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】
成人(15歳以上)1回1瓶(30mL)を1日2回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。○用法・用量を厳守すること。

【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがありますよく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ガラス:ビン 金属:キャップ 01NRIELKW

4 987307 422710

製造販売元 中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

お客様相談室:0595-21-3200
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造番号 [redacted]

使用期限