

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ネオグロンビター内服液  
ゴールド(滋養強壯薬)

使用上の注意〔相談すること〕 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること／皮膚：発疹／消化器：胃部不快感・下痢 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量(30mL)中  
チアミン硝化物(ビタミンB1) 10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 25mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg、タウリン 1,000mg、ニンジンエキス 40.3mg(原生薬換算量 600mg)、オウギ流エキス 0.3mL(原生薬換算量 300mg)、ジオウ流エキス 0.3mL(原生薬換算量 300mg)、タイソウ流エキス 0.1mL(原生薬換算量 100mg)、トウキ流エキス 0.2mL(原生薬換算量 200mg) 添加物：pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、パラベン、ポビドン、アセスルファミンK、液糖、D-ソルビトール、香料(安息香酸ベンジル、エタノール、エチルバニリン、グリセリン、大豆油、バニリン、プロピレングリコール、フェノール、トメントール)(アルコール)

発熱性消耗性疾患時の  
栄養補給

ネオグロンビター  
内服液ゴールド

滋養強壯



第3類医薬品 30mL

常盤薬品

NOEVIR GROUP

0.4mL以下)●ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。 効能・効果 ○滋養強壯○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 用法・用量 成人(15才以上)1日1回、1本(30mL)を服用すること。<用法・用量に関連する注意>(1)内服にのみ使用すること。(2)用法・用量を守ること。(3)服用時にはアンプルの頸部を折り、添付のストローで吸飲すること。 保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

製造販売元  
常盤薬品工業株式会社  
大阪市中央区安土町3-5-12  
NOEVIR GROUP

お問い合わせは  
0120-875-710まで  
www.kusuribako.jp  
副作用被害救済制度  
0120-149-931  
400円(税別)

114400  
FSE801

使用  
期限  
製造  
番号

