

成分・分量

1日量(60丸中)	1.2g
ケイヒ末	1.2g
ブクリョウ末	1.2g
ボタンビ末	1.2g
シャクヤク末	1.2g
トウニン末	1.2g
添加物としてハチミツ、コメデングン、セラックを含有する。	

【成分・分量】に関連する注意】

- (1)本剤は、生薬を原料として製造していますので、製品により色や味等が多少異なる場合があります。
 (2)丸剤が密着することがあります。これは配合しているハチミツのねばりによるものですから、心配なく服用してください。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
 (2)小児の手の届かない所に保管してください。
 (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

効能・効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせ、足冷えなどを訴えるものの次の諸症:月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

【効能・効果】に関連する注意】

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【用法・用量】

大人(15歳以上).....1回20丸
 1日3回、白湯又は常水にて通常食間に服用する。

【用法・用量】に関連する注意】

用法・用量を厳守してください。

【副作用被害救済制度】
 ☎ 0120-149-931

製造販売元
 二反田薬品工業株式会社
 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号

**△ 使用上の注意****相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 (1) 医師の治療を受けている人。
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師 使用期限又は登録販売者に相談してください。

製造番号

容 量

5000丸

987397 003776



ボトルキャップ
中
外装フィルム
スプーン