

第3類医薬品

AMINO WHITE
ミノホワイ

180錠 (30日分)

EGAO

開封の注意

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小瓶の蓋の隙がない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(劇用の瓶口になったり湿気がたまる。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

この製品についての問い合わせは、下箱にお願い申し上げます。

株式会社 えがお 電話:0120-241-241
HP: <http://www.241241.jp>

副作用報告済制度の問い合わせ先
（社）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhousa_cmg/index.html
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル)


製造販売元 中村薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町丹生谷31-32

販売元
株式会社 えがお
加太県熊本市東区東町4-10-1



製造番号
使用期限

お問い合わせ先 株式会社 えがお



●容器の中の詰め物は本剤の紛れ防止用です。開封時に捨ててください。ただし、軽微剤はそのまま容器に入れた状態で保管してください。

成分・分量

5錠(成人1日量)中

アスコルビン酸カルシウム	363mg
アスコルビン酸(ビタミンC)として300mg	
パントテン酸カルシウム	24mg
L-システイン	240mg

添削物として、乳酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、加水ケイ酸、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、カルナウバロウを含む。

成分・分量に関連する注意

ビタミンCを含む本剤は、尿及び大便の酸化に影響を及ぼすことがあります。医師の治療を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

効能・効果

- しみ・そばかす
- 日やけなどの色素沈着症
- 全身倦怠
- 二日酔い
- にきび、湿疹、じんましん、かぶれ、くすり肌

用法・用量

次の量を1日3回、水又は白濁にて服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	3回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満		服用しないこと

用法・用量に関連する注意

- (1)定められた用法、用量をお守りください。
- (2)7歳以上15歳未満の小児に服用させる場合には、保護者の許可を得るものと服用させてください。
- (3)本剤がどのくらい効果があることのないよう、よく注意してください。

EGAO 顔・背中・腕など

日やけ・しみ
そばかすなどの
色素沈着症に
飲んで効果がでる医薬品

L-システイン
240mg

パントテン酸
カルシウム

アスコルビン酸
カルシウム
(ビタミンC)

第3類医薬品

アミノホワイ

からだの中から
健康な肌へ
180錠

●本剤にぬれた手で触れないでください。又、手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますのでご注意ください。

第3類医薬品

L-システイン製剤
アミノホワイ

本剤はL-システインを主剤とし、これにビタミンC、パントテン酸カルシウムを配合したL-システイン製剤です。L-システインは、しみ・そばかすの原因となる過剰なメラニン色素の生成を抑制し、ビタミンCと協力して、しみ・そばかす・日やけなどの色素沈着を改善します。又、代謝作用の働きを助け、全身倦怠、二日酔いにも効果をあらわします。

服用に際して、下箱の服用方法を必ずお読みください。又、飲酒はとくに禁むよう大切に保管してください。

△使用上の注意

●相関すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐、腹痛

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強があらわれた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。なお、下痢。
3. はらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。