ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

目薬

第2類医薬品

疲れた瞳リフレッシュ！ スーパークールなさし心地

ラスタークールプロ®

●つらい疲れ目に
ピント調節機能
改善成分配合

●充血・炎症をケア
充血除去成分や
炎症を抑える
成分を配合

●最高レベルの清涼感※

清涼感レベル

1 2 3 4 5+++

弱 ←→ 強

※当社目薬中

⚠ 使用上の注意

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3)次の症状のある人
　はげしい目の痛み
(4)次の診断を受けた人
　緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1)目のかすみが改善されない場合
(2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

＜用法用量に関連する注意＞

(1)用法用量を厳守して下さい。
(2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
(4)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
(5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
(6)点眼用にのみ使用して下さい。

【成分分量】 100mL中

成　　分	分　量	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により、結膜充血をおさえます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節機能改善作用により、目の疲れを改善します。
硫酸亜鉛水和物	100mg	紫外線等による目の炎症をしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血をやわらげます。
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）	100mg	新陳代謝を促進し、目の疲れをやわらげます。
酢酸d−α−トコフェロール（天然型ビタミンE）	10mg	血行改善作用により、目への栄養補給をたすけます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	500mg	目の乾燥を防ぎ、眼病を予防します。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、*l*−メントール、d−カンフル、ユーカリ油、エデト酸Na、クロロブタノール、パラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
（高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。）
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3)他の容器に入れ替えないで下さい。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4)他の人と共用しないで下さい。
(5)使用期限（外箱に記載）の過ぎた商品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。
(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用下さい。

■お問い合わせ先
滋賀県製薬株式会社　くすり相談室
電　　話：(0748) 88−3180（大代表）
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/
電話　0120−149−931（フリーダイヤル）

製造販売元
滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879

®登録商標
1N8