

使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮痒消炎薬

かゆみ・虫さされ・かぶれ・湿疹

フジアド-EX

- ◆ **フジアド-EX** は、アンテドラッグステロイド剤「プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)」を主成分とした外用液剤です。アンテドラッグは、患部で優れた効果を発揮したのち、体内に吸収されると低活性物質に変化します。PVAは湿疹や皮膚炎等の炎症をしずめます。
- ◆ ジフェンヒドラミン塩酸塩とクロタミトンが虫さされや湿疹等のかゆみを抑えます。
- ◆ l-メントールとdl-カンフルの強い清涼感がかゆみをしずめます。
- ◆ イソプロピルメチルフェノールが患部を殺菌します。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - (2)創傷面、目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4)患部が広範囲の人
 - (5)湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚 (患 部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能 ・ 効 果

虫さされ、かゆみ、皮膚炎、かぶれ、湿疹、あせも、じんましん

用法・用量

- 1日数回、適量を患部に塗布してください。
○塗布部をお肌に当てて軽く押し、塗布部に薬液をしみ込ませてから、患部に軽く塗ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

成分・分量

100mL中

成分	分量	はたらき
プレドニゾン吉草酸エステル 酢酸エステル (PVA)	0.15 g	抗炎症作用により、はれ、赤みを抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0 g	抗ヒスタミン作用により、かゆみを抑えます。
クロタミン	5.0 g	湿疹・かぶれ等に伴うかゆみを抑えます。
dl-カンフル	1.0 g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
l-メントール	3.5 g	
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌作用があります。

添加剤：マクロゴール、プロピレングリコール、ラウロマクロゴール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、ジブチルヒドロキシルエン、八アセチルしょ糖、エタノール 含有

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)次の物には付着させないでください。(変質する場合があります。)
床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリ類、プラスチック類、化繊製品、皮革製品等。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべくはやく使用してください。
- (7)使用後はキャップをしっかりと締め、容器を立てて、保管してください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (OTC学術室)
電話 (048) 648-1118 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地