

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人
(3) 15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等
(2) 皮膚の弱い部位(顔、わきの下等)
(3) 湿疹、かぶれ、傷口
(4) みずむしたむし等又は化膿している患部

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないこと

4. 連続して2週間以上使用しないこと

(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けること)

👩‍⚕️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(4) 高齢者
(5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、色素沈着
消 化 器	胃部不快感、みぞおちの痛み
そ の 他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用后、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢・軟便

4. 5～6日間使用しても症状がよくなりません場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(他の疾患の可能性があるので)

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりと閉めて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
- (4) 火気に近づけないこと
- (5) 火の中に投げないこと
- (6) 本剤のついた手で、目等の粘膜に触れないこと
- (7) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面等に付着すると変質又は変色することがあるので、付着しないように注意すること
- (8) 本剤が衣類や寝具等に付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落とすこと
- (9) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用すること

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性エタノール含有物



副作用被害救済制度
電話：0120-149-931

外用鎮痛消炎剤
販売名: サンツールLX液

第2類医薬品

内容量25g
02

製造販売元

東和製薬株式会社

和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

↑から開けて下さい。



第2類医薬品

25g

【効能・効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

【用法・用量】

1日3～4回適量を患部に塗布して下さい。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を守ること
- (2) 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用すること
- (4) 1回あたり約2g、1週間あたり50gを超えて使用しないこと
- (5) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (6) 外用にのみ使用すること
- (7) 使用後は手を洗うこと

【成分・分量】 (100g中)

成 分	分 量
ロキソプロフェン	1.13g
ナトリウム水和物	(無水物として1g)

添加物: マクロゴール400、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、ヒプロメロース、l-メントール、エタノール

セルフメディケーション

税 控除 対象



お客様相談窓口

お買い求めのお店又は、
下記窓口まで
電話 0120-108-871
受付時間 9:00～17:30
(土・日・祝日を除く)