

## ワクチン接種を受ける人へのガイド

2018年10月更新

# インフルエンザ HA ワクチン

### 【このワクチンの名前は？】

販売名	インフルエンザ HA ワクチン「KMB」 Influenza HA Vaccine “KMB”
一般名	インフルエンザ HA ワクチン Influenza HA Vaccine

#### ワクチン接種を受ける人へのガイドについて

ワクチンの正しい理解と、重大な副反応の早期発見などに役立てていただくために、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、特に知っていただきたいことをわかりやすく記載しています。添付文書情報は PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に掲載されています。※副反応：ワクチンの副作用のこと

### 【このワクチンの効果は？】

- ・ このワクチンは、次の目的で接種されます。  
**インフルエンザの予防**
- ・ このワクチンの接種によりインフルエンザウイルスに対する抗体ができ、かかりにくくなります。

### 【このワクチンの接種前に、確認すべきことは？】

- ワクチン接種を受ける人または家族の方などは、このワクチンの効果や副反応などの注意すべき点について十分理解できるまで説明を受けてください。説明に同意した上で接種を受けてください。
- 医師が問診、検温および診察の結果から、接種できるかどうか判断します。
- 次の人は、このワクチンの接種を受けることはできません。
  - ・ 明らかに発熱（通常 37.5℃以上）している人
  - ・ 重篤な急性疾患にかかっている人
  - ・ 過去にこのワクチンに含まれている成分でアナフィラキシーをおこしたことがある人
  - ・ 上記以外に医師が予防接種を行うことが不適切な状態にあると判断した人

- 次の人は、医師が健康状態や体質に基づいて、接種の適否を判断します。
  - ・ 心臓や血管、腎臓、肝臓、血液の障害や発育の障害などの基礎疾患がある人
  - ・ 他のワクチンの接種を受けて、2日以内に発熱があった人や全身性の発疹などアレルギーが疑われる症状が出たことがある人
  - ・ 過去にけいれんをおこしたことがある人
  - ・ 過去に免疫に異常があると診断されたことがある人や両親や兄弟に先天性免疫不全症の人がいる人
  - ・ 間質性肺炎や気管支喘息などの呼吸器の病気がある人
  - ・ このワクチンに含まれている成分に対してアレルギーをおこすおそれがある人
  - ・ 鶏由来のもの（鶏卵や鶏肉など）にアレルギーをおこすおそれがある人
  - ・ 高齢の人
- 妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- 併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- すでに生ワクチン\*の接種を受けている場合、生ワクチン接種4週間後からこのワクチンを接種できます。すでに不活化ワクチン\*の接種を受けている場合、不活化ワクチン接種1週間後からこのワクチンを接種できます。

\*生ワクチン、不活化ワクチンの詳細は巻末をご覧ください。


## 【このワクチンの接種スケジュールは？】

### ● 接種量および回数

年齢	1回量	接種回数
6ヶ月以上3歳未満の人	0.25 mL	2～4週間間隔で2回接種
3歳以上13歳未満の人	0.5 mL	2～4週間間隔で2回接種
13歳以上の人	0.5 mL	1回 または1～4週間間隔で2回接種

[定期接種<sup>1</sup>]

- ・ 65歳以上の人
- ・ 60歳から64歳の人で以下の人
  - ・ 心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限されている人
  - ・ ヒト免疫不全ウイルス（HIV）で免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人



60歳

毎年1回

- ・ 個人によって接種スケジュールが異なる場合があります。
- ・ このスケジュール中に、接種を受けられなかった場合は医師に相談してください。

[任意接種<sup>ii</sup>]

- ・ 希望される場合には医師に相談してください。

i 定期接種：予防接種法で定められた予防接種を、決められた年齢で受ける場合

ii 任意接種：予防接種法で定められていない予防接種や、定期接種で定められた年齢から外れて受ける場合

- 医師が必要と認めた場合には、同時に他のワクチンの接種を受けることができます。

## 【このワクチンの接種後に気をつけなければならないことは？】

- ・ 接種当日は激しい運動をさけ、接種部位を清潔に保ってください。
- ・ 接種後は健康状態によく気をつけてください。接種部位の異常な反応や体調の変化、高熱、けいれんなどの異常を感じた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- ・ 接種後に、アナフィラキシー（全身のかゆみ、じんま疹、息苦しい、動悸（どうき）など）がおこることがあります。アナフィラキシーは通常接種後30分以内におこることが多いので、この間接種施設で待機するか、すぐに医師と連絡をとれるようにしておいてください。
- ・ このワクチンはチメロサル（添加物）を含んでいます。チメロサルを含む製剤で、過敏症（発熱、発疹、じんま疹、紅斑、かゆみなど）があらわれたとの報告があります。これらの症状があらわれたら医師の診察を受けてください。
- ・ 他の医師を受診したり、他のワクチンを接種したりする場合は、必ずこのワクチンを接種したことを医師、薬剤師または看護師に伝えてください。

## 副反応は？

特にご注意ください重大な副反応と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副反応であれば、それぞれの重大な副反応ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師に相談してください。


重大な副反応	主な自覚症状
ショック	冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる、意識の消失
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい
急性散在性脳脊髄炎 (ADEM) きゅうせいさんざいせいのうせきず いえん (アデム)	頭痛、発熱、嘔吐（おうと）、意識の低下、目が見えない、手足が動きにくい、歩きにくい、感覚が鈍い
脳炎・脳症 のうえん・のうしょう	発熱、まひ、意識の低下、頭痛、意識の消失、考える力の低下、記憶力の低下、異常な行動、けいれん、自分の意思とは関係なく身体が動く
脊髄炎 せきずいえん	発熱、うなじの硬直、両足のまひとしびれ、背中や腰の痛み、排尿感覚がなくなる
視神経炎 ししんけいえん	視力の低下、中心部が見づらい、目のかすみ、目を動かすと痛い
ギラン・バレー症候群 ギラン・バレーしょうこうぐん	両側の手や足に力が入らない、歩行時につまずく、階段を昇れない、物がつかみづらい、手足の感覚が鈍くなる、顔の筋肉がまひする、食べ物が飲み込みにくい、呼吸が苦しい
けいれん	顔や手足の筋肉がびくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる
喘息発作 ぜんそくほっさ	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと音がする、息苦しい

<p>血小板減少性紫斑病、 血小板減少</p> <p>けっしょうばんげんしょうせいしは んびょう、けっしょうばんげんしょ う</p>	<p>鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が 止まりにくい</p>
<p>血管炎（I g A血管炎、 好酸球性多発血管炎性 肉芽腫症、白血球破碎性 血管炎等）</p> <p>けっかんえん（アイジーエーけっか んえん、こうさんきゅうせいたはつ けっかんえんせいにくげしゅしょ う、はつけっきゅうはさいせいけっ かんえんとう）</p>	<p>皮下出血によるあざ、関節痛、腹痛、血尿、息を するときヒューヒューと音がする、手足のしびれ、 発熱、皮下出血によるあざ、あおあざができる、 じんま疹</p>
<p>間質性肺炎</p> <p>かんしつせいはいえん</p>	<p>咳、息切れ、息苦しい、発熱</p>
<p>皮膚粘膜眼症候群（ステ ィーブンス・ジョンソン 症候群）</p> <p>ひふねんまくがんしょうこうぐん</p>	<p>発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円 形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴っ たものが多発する</p>
<p>ネフローゼ症候群</p> <p>ネフローゼしょうこうぐん</p>	<p>尿量が減る、排尿時の尿の泡立ちが強い、息苦し い、尿が赤みを帯びる、むくみ、体がだるい、体 重の増加</p>

以上の自覚症状を、副反応のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副反応ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、ふらつき、発熱、感覚が鈍い、まひ、けいれん、自分の意思とは関係なく身体が動く、顔や手足の筋肉がぴくつく、疲れやすい、体がだるい、力が入らない、体がかゆくなる、出血が止まりにくい、むくみ、体重の増加
頭部	めまい、意識の消失、頭痛、意識の低下、考える力の低下、記憶力の低下、異常な行動、一時的にボーっとする
顔面	顔面蒼白（そうはく）、顔の筋肉がまひする、鼻血
眼	目が見えない、視力の低下、中心部が見づらい、目のかすみ、目を動かすと痛い、物がつかみづらい、白目が黄色くなる、目の充血やただれ
口や喉	喉のかゆみ、嘔吐、うなじの硬直、食べ物が飲み込みにくい、吐き気、歯ぐきの出血、咳、唇や口内のただれ
胸部	動悸、息苦しい、呼吸が苦しい、息をするときゼーゼー、ヒューヒューと音がする、息をするときヒューヒューと音がする、息切れ
腹部	食欲不振、腹痛
背中	背中や腰の痛み
手・足	手足が冷たくなる、手足が動きにくい、歩きにくい、両足のまひとしびれ、両側の手や足に力が入らない、歩行時につまずく、手足の感覚が鈍くなる、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える、関節痛、手足のしびれ
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹、皮膚が黄色くなる、あおあざができる、皮下出血によるあざ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
筋肉	階段を昇れない
尿	排尿感覚がなくなる、尿の色が濃くなる、血尿、尿量が減る、排尿時の尿の泡立ちが強い、尿が赤みを帯びる

## 【このワクチンの形は？】

容器の形状	性状
	<p>澄明又はわずかに白濁した液剤</p>

写真はほぼ原寸大です。

## 【このワクチンに含まれているのは？】

有効成分	<p>A/シンガポール/GP1908/2015 (H1N1) pdm09  A/シンガポール/INF1MH-16-0019/2016 (H3N2)  B/プーケット/3073/2013 (山形系統)  B/メリーランド/15/2016 (ビクトリア系統)</p>
添加物	<p>ホルマリン、チメロサル、塩化ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、リン酸二水素カリウム</p>

## 【このワクチンについてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副反応などのより詳しい質問がある場合は、医師や薬剤師、看護師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：KMバイオロジクス株式会社  
(<http://www.kmbiologics.com>)

販売会社：アステラス製薬株式会社  
(<http://www.astellas.com/jp/>)

くすり相談センター

電話：0120-865-093

受付時間：9時～17時30分（土、日、祝日、会社休日を除く）

【参考】 このワクチンの接種を受ける前に他のワクチンを受けている場合

- 生ワクチンを受けている場合は、27日以上間隔を空けてこのワクチンを接種します。

生ワクチンとは	ワクチンの例
病原体となるウイルスあるいは細菌の毒性を弱めて病原性をなくしたものを原材料として作られたワクチンです。	BCG、麻しん風しん混合（MR）、麻しん、風しん、水痘（みずぼうそう）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、経口ロタウイルス、黄熱

- 不活化ワクチンを受けている場合は、6日以上間隔を空けてこのワクチンを接種します。

不活化ワクチンとは	ワクチンの例
病原体となるウイルスや細菌の感染する能力を失わせた（不活化、殺菌）ものを原材料として作られたワクチンです。	不活化ポリオ、ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ（DPT-IPV）四種混合、ジフテリア・百日せき・破傷風（DPT）三種混合、ジフテリア・破傷風（DT）二種混合、破傷風トキソイド、ジフテリアトキソイド、日本脳炎、インフルエンザ、インフルエンザ菌b型（Hib）、肺炎球菌（13価結合型）、ヒトパピローマウイルス（HPV）、A型肝炎、B型肝炎、肺炎球菌（23価多糖体）、狂犬病、髄膜炎菌