

コントミン糖衣錠 12.5mg
 コントミン糖衣錠 25mg
 コントミン糖衣錠 50mg
 コントミン糖衣錠 100mg

【この薬は？】

販売名	コントミン 糖衣錠 12.5mg CONTOMIN SUGAR-COATED TABLETS 12.5mg	コントミン 糖衣錠 25mg CONTOMIN SUGAR-COATED TABLETS 25mg	コントミン 糖衣錠 50mg CONTOMIN SUGAR-COATED TABLETS 50mg	コントミン 糖衣錠 100mg CONTOMIN SUGAR-COATED TABLETS 100mg
一般名	クロルプロマジン塩酸塩 Chlorpromazine Hydrochloride			
含有量 (1錠中)	12.5mg	25mg	50mg	100mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、精神神経用剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経伝達物質の受容体に作用してそのバランスを整えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

統合失調症、躁病、神経症における不安・緊張・抑うつ、悪心・嘔吐（おうと）、吃逆、破傷風に伴うけいれん、麻酔前投薬、人工冬眠、催眠・鎮静・鎮痛剤の効力増強

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・昏睡状態の人、循環虚脱状態にある人
 - ・バルビツール酸誘導体や麻酔剤などの中枢神経抑制剤の強い影響下にある人
 - ・アドレナリン（ボスミン）を使用している人（アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療、または歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く）
 - ・過去にフェノチアジン系化合物およびその類似化合物で過敏症のあった人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・皮質下部の脳障害（脳炎、脳腫瘍、頭部外傷後遺症など）の疑いのある人
 - ・血液障害のある人
 - ・褐色細胞腫またはパラガングリオーマ、動脈硬化症あるいは心臓に障害の疑いのある人
 - ・重い喘息、肺気腫、呼吸器感染症などのある人
 - ・てんかんなどのけいれんをおこす病気のある人、または過去にてんかんなどのけいれんがあった人
 - ・高温環境にある人
 - ・脱水の人や栄養状態の悪い人
 - ・長時間動かないでじっとしている人、長期間病床にある人、肥満の人、脱水状態の人
 - ・肝臓に障害のある人
 - ・妊婦または妊娠している可能性がある人
 - ・授乳中の人
- この薬には併用してはいけない薬[アドレナリン（アナフィラキシーの救急治療、または歯科領域における浸潤麻酔もしくは伝達麻酔に使用する場合を除く）（ボスミン）] や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの年齢、疾患や症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および飲む回数は、次のとおりです。

【精神科領域以外の場合】

販売名	コントミン 糖衣錠 12.5mg	コントミン 糖衣錠 25mg	コントミン 糖衣錠 50mg	コントミン 糖衣錠 100mg
一日量	クロルプロマジン塩酸塩として 30～100mg			

飲む回数	1日数回に分けて飲みます。
------	---------------

【精神科領域の場合】

販売名	コントミン 糖衣錠 12.5mg	コントミン 糖衣錠 25mg	コントミン 糖衣錠 50mg	コントミン 糖衣錠 100mg
一日量	クロルプロマジン塩酸塩として 50～450mg			
飲む回数	1日数回に分けて飲みます。			

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

傾眠（刺激がないと眠ってしまう）、昏睡（意識の消失、刺激に全く反応しない）、血圧低下（脱力感、めまい、ふらつき、立ちくらみ、気を失う）、錐体外路症状（動きが遅い、眼球が上を向く、首のねじれやつっぱり、手足のふるえやこわばり、筋肉のこわばり、足がそわそわして落ち着かない）、激越（感情が激しくたかぶった状態、落ち着きがない）、情緒不安（ちょっとしたことで不安になる、イライラする、感情がコントロールできない）、けいれん（顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える）、口渇、腸閉塞（便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐（おうと）、お腹が張る、腹痛）、心電図変化および不整脈（めまい、動悸、脈が遅くなる、気を失う、脈がとぶ）などがあらわれる可能性があります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合には、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作を行わないでください。
- ・治療初期に起立性低血圧が起こることがあるので、脱力感、めまい、ふらつき、立ちくらみ、気を失うなどの症状があらわれたら、医師に連絡してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・幼児、小児では錐体外路症状（動きが遅い、眼球が上を向く、首のねじれやつっぱり、手足のふるえやこわばり、筋肉のこわばり、足がそわそわして落ち着かない）、特にジスキネジア（意思に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず嚙むような口の動き、意思に反して体が動く）がおこりやすいので、これらの症状があらわれたら、医師に相談してください。
- ・高齢の人では起立性低血圧、錐体外路症状、脱力感、運動失調（手足の動きがぎこちない、しゃべりにくい、ふらつき、まっすぐ歩けない）、排泄障害などがおこりやすいので、これらの症状があらわれたら、医師に相談してください。
- ・アルコール飲料はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬

を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。


重大な副作用	主な自覚症状
Syndrome malin (悪性症候群) シンドローム マリン (あくせいしょうこうぐん)	高熱、汗をかく、ぼーっとする、手足のふるえ、体のこわばり、話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、脈が速くなる、呼吸数が増える、血圧が上昇する
突然死 とつぜんし	気を失う
心室頻拍 (Torsade de Pointes を含む) しんしつひんぱく	めまい、動悸 (どうき) 、胸の不快感、気を失う
再生不良性貧血 さいせいふりょうせいひんけつ	めまい、体がだるい、息切れ、動悸 (どうき) 、あおあざができる、出血が止まりにくい、発熱、寒気、喉の痛み
溶血性貧血 ようけつせいひんけつ	体がだるい、めまい、息切れ、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
白血球減少 はっけつきゅうげんしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
麻痺性イレウス まひせいイレウス	便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐 (おうと) 、お腹が張る
遅発性ジスキネジア ちはつせいジスキネジア	意思に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず嚙むような口の動き、意思に反して体が動く
遅発性ジストニア ちはつせいジストニア	意図しないのに身体 (手足) がうごいてしまい、制御できない
抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) こうりにょうホルモンふてきごうぶんびつしょうこうぐん (エスアイエーディーエイチ)	けいれん、意識の低下、意識の消失、吐き気、食欲不振
眼障害 がんしょうがい	目のかすみ、物が見えにくい、目の異物感、目の痛み、視力の低下、まぶしい
SLE 様症状 エスエルイーようしょうじょう	体がだるい、関節の痛み、発熱、顔の赤い発疹、体重減少
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振



黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
肺塞栓症 はいそくせんしょう	胸の痛み、突然の息切れ
深部静脈血栓症 しんぶじょうみやくけっせんしょう	発熱、皮膚が青紫～暗紫色になる、手足の爪が青紫～暗紫色になる、唇が青紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	高熱、汗をかく、体のこわばり、体がだるい、出血が止まりにくい、発熱、寒気、突然の高熱、意思に反して体が動く、けいれん、体重減少、疲れやすい、力が入らない、体がかゆくなる、脱力感、意図しないのに身体（手足）がうごいてしまい、制御できない
頭部	ぼーっとする、気を失う、めまい、意識の低下、意識の消失
顔面	顔の赤い発疹
眼	白目が黄色くなる、目のかすみ、物が見えにくい、目の異物感、目の痛み、視力の低下、まぶしい
口や喉	話しづらい、よだれが出る、飲み込みにくい、喉の痛み、吐き気、嘔吐（おうと）、意思に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず嚙むような口の動き、胸の痛み、突然の息切れ、唇が青紫色になる
胸部	呼吸数が増える、動悸（どうき）、胸の不快感、息切れ
腹部	お腹が張る、食欲不振
手・足	手足のふるえ、脈が速くなる、関節の痛み、手足のこわばり、手足のしびれ、手足の爪が青紫～暗紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み
皮膚	あおあざができる、皮膚が黄色くなる、皮膚が青紫～暗紫色になる
筋肉	筋肉の痛み
便	便やおならが出にくい
尿	尿の色が濃くなる、尿が赤褐色になる
その他	血圧が上昇する

【この薬の形は？】

販売名	コントミン 糖衣錠 12.5mg	コントミン 糖衣錠 25mg
P T Pシート		
形状	糖衣錠 	糖衣錠 
直径	7.4mm	7.7mm
厚さ	4.7mm	4.6mm
重さ	220mg	220mg
色	黄色	白色
識別コード	Y-C012.5	Y-C025

販売名	コントミン 糖衣錠 50mg	コントミン 糖衣錠 100mg
P T Pシート		
形状	糖衣錠 	糖衣錠 
直径	8.5mm	9.5mm
厚さ	5.1mm	5.4mm
重さ	300mg	400mg
色	淡黄色	黄色
識別コード	Y-C050	Y-C0100

【この薬に含まれているのは？】

販売名	コントミン 糖衣錠 12.5mg	コントミン 糖衣錠 25mg
有効成分	クロルプロマジン塩酸塩	
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ポビドン、タルク、ステアリン酸マグネシウム、白糖、アラビアゴム、炭酸カルシウム、マクロゴール 6000、カルナウバロウ、黄色 4 号（タートラジン）アルミニウムレーキ	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ポビドン、タルク、ステアリン酸マグネシウム、白糖、アラビアゴム、炭酸カルシウム、マクロゴール 6000、カルナウバロウ

販売名	コントミン 糖衣錠 50mg	コントミン 糖衣錠 100mg
有効成分	クロルプロマジン塩酸塩	
添加物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ポビドン、タルク、ステアリン酸マグネシウム、白糖、アラビアゴム、炭酸カルシウム、マクロゴール 6000、カルナウバロウ、黄色 4 号（タートラジン）アルミニウムレーキ	

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：田辺三菱製薬株式会社

(<https://www.mt-pharma.co.jp>)

くすり相談センター

電話：0120-331-195

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、会社休業日を除く）