

## ヒューマログ注 100 単位/mL

### 【この薬は？】

販売名	ヒューマログ注 100 単位/mL Humalog
一般名	インスリン リスプロ（遺伝子組換え） Insulin Lispro (Genetical Recombination)
含有量 (1 製剤中)	1000 単位

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」  
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・ この薬は、超速効型インスリンアナログ製剤と呼ばれるグループに属する注射薬です。
- ・ この薬は、細胞内への糖の取り込み、肝臓での糖新生の抑制、および肝臓、筋肉におけるグリコーゲン合成の促進作用などにより血糖値を下げます。
- ・ 次の病気の人に処方されます。

#### インスリン療法が適応となる糖尿病

- ・ この薬は他の持続型インスリン製剤と併用されることがあります。
- ・ この薬は、医療機関において、適切な在宅自己注射教育を受けた患者または家族の方は、自己注射できます。自己判断で使用を中止したり、量を加減せず、医師の指示に従ってください。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・ 低血糖症状の人
- ・ 過去にヒューマログ注に含まれる成分で過敏症を経験したことがある人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・ インスリンの必要量の変動が激しい人
  - ・ 手術をした人、外傷をうけた人、感染症にかかっている人など
  - ・ 妊娠している人
- ・ 低血糖を起こしやすい次の人
  - ・ 肝臓または腎臓に重篤な障害がある人
  - ・ 脳下垂体機能に異常のある人、副腎機能に異常のある人
  - ・ 下痢または嘔吐（おうと）などの胃腸障害のある人
  - ・ 飢餓状態の人、不規則な食事の人
  - ・ 激しい筋肉運動をしている人
  - ・ 飲酒量の多い人
  - ・ 高齢の人
  - ・ 血糖降下作用を増強する薬剤を併用している人
- ・ 低血糖を起こすと事故につながるおそれがある人（高所作業、自動車の運転などの作業に従事している人など）
- ・ 自律神経に障害のある人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

### ●使用量および回数


使用量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人では1回2～20単位を毎食直前に皮下注射しますが、持続型インスリン製剤を併用したり、ときに注射回数を増やします。持続型インスリン製剤の使用量を含めた維持量は通常1日4～100単位です。

必要に応じ持続皮下注入ポンプを用いて使用します。

### ●どのように使用するか？

- ・ 注射器を用いて皮下注射します。
- ・ 皮下注射は、腹部、大腿部（だいたいふ）、上腕部、臀部（でんぶ）などに行います。注射部位により吸収速度が異なり、その結果、作用発現時間が異なるので、部位を決め、その中で注射場所を毎回変えてください。前回の注射場所から2～3cm離して注射してください。



- ・ 静脈内に注射しないでください。皮下注射したとき、まれに注射針が血管内に入り、注射後直ちに低血糖があらわれることがあるので注意してください。
- ・ 使用済みの注射器は、取り外した針先が突き出ないような安全な容器に入れた後、子供の手の届かないところに保管してください。

#### ●使用し忘れた場合の対応

- ・ 決して2回分を一度に注射しないでください。
- ・ 注射をし忘れた場合は、医師に相談してください。

#### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

- ・ 低血糖症状（脱力感、強い空腹感、冷や汗、動悸（どうき）、手足のふるえ、意識が薄れるなど）があらわれる可能性があります。
- ・ 低血糖症状が認められるものの、意識障害がない場合は、通常は砂糖をとってください。α-グルコシダーゼ阻害剤（アカルボース、ボグリボース、ミグリトール）を併用している場合は、ブドウ糖をとってください。意識が薄れてきた場合は、医師に連絡してください。
- ・ 低血糖症状の一つとして意識障害をおこす可能性もありますので、この薬を使用していることを必ずご家族やまわりの方にも知らせてください。

### 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ この薬を使用するにあたっては、注射法や低血糖症状への対処法などについて、患者さんまたは家族の方は十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・ 指示された時間に食事をとらなかったり、食事の量が少なかったり、予定外の激しい運動を行った場合、低血糖症状があらわれることがあります。低血糖症状に関する注意を必ずご家族にも知らせてください。低血糖症状が認められるものの、意識障害がない場合は、通常は砂糖をとってください。α-グルコシダーゼ阻害剤（アカルボース、ボグリボース、ミグリトール）を併用している場合は、ブドウ糖をとってください。意識が薄れてきた場合は、医師に連絡してください。**副作用は？**に書かれていることに特に注意してください。
- ・ 使用方法に間違いがあったり使用を忘れていたりして、体内のインスリンが不足すると高血糖を起こすことがあります。高血糖が無処置の状態が続くと、悪心（おしん）、嘔吐、眠気、潮紅、口渇、頻尿、脱水、食欲減退、呼気のアセトン臭、ケトアシドーシス、昏睡などを起こし、重篤な転帰をたどるおそれがあります。これらの症状があらわれたら受診してください。
- ・ 肝機能障害（白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐、食欲不振、かゆみ、皮膚が黄

色くなる、尿が黄色い) があらわれることがあるので、これらの症状があらわれたら受診してください。

- ・ 急激な血糖のコントロールに伴い、糖尿病網膜症があらわれたり、悪化したり、目の屈折異常がおこったり、痛みを伴う神経障害があらわれることがあります。
- ・ 高所での作業や自動車の運転など、危険を伴う作業に従事しているときに低血糖を起こすと事故につながるおそれがありますので、特に注意してください。
- ・ 妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・ 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
低血糖 ていけつとう	お腹がすく、冷汗が出る、血の気が引く、疲れやすい、手足のふるえ、けいれん、意識の低下
アナフィラキシーショック	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、冷汗が出る、めまい、顔面蒼白(そうはく)、手足が冷たくなる、動悸
血管神経性浮腫 けっかんしんけいせいふしゅ	唇・まぶた・舌・口の中・顔・首が急に腫れる、喉がつまる感じ、息苦しい、声が出にくい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、疲れやすい、けいれん、ふらつき
頭部	意識の低下、めまい
顔面	血の気が引く、顔面蒼白、唇・まぶた・舌・口の中・顔・首が急に腫れる
口や喉	喉のかゆみ、喉がつまる感じ、声が出にくい
胸部	動悸、息苦しい
腹部	お腹がすく
手・足	手足のふるえ、手足が冷たくなる
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

## 【この薬の形は？】

販売名	ヒューマログ注 100 単位/mL
性状	無色澄明の液
内容量	10mL
容器の形状	

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
添加物	濃グリセリン、m-クレゾール、リン酸水素二ナトリウム七水和物、酸化亜鉛、pH 調節剤

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・ 使用開始前は凍結を避けて冷蔵庫など（2～8℃）で保管してください。光を避けてください。
- ・ 使用開始後も凍結を避けて冷蔵庫など（2～8℃）で保管してください。もし、冷蔵庫などで保管できない場合は室温（30℃以下）で保管してください。光を避けてください。
- ・ 使用開始後は 28 日以内で使用してください。
- ・ 子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・ 絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・ 余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

### ●廃棄方法は？

- ・ 使用済みの注射器、バイアルについては、医療機関の指示どおりに廃棄してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：日本イーライリリー株式会社 (<http://www.lilly.co.jp>)

日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口

Lilly Answers（リリーアンサーズ）

電話：0120-245-970（一般の方、患者様向け）

受付時間：8時45分～17時30分  
(土、日、祝日、その他当社の休業日を除く)