

スタリビルド配合錠

【この薬は？】

販売名	スタリビルド配合錠 Stribild Combination Tablets
一般名	エルビテグラビル／コビススタット／エムトリシタビン／ テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩 Elvitegravir / Cobicistat / Emtricitabine / Tenofovir Disoproxil Fumarate
含有量 (1錠中)	エルビテグラビル 150 mg／コビススタット 150 mg／ エムトリシタビン 200 mg／ テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩 300 mg (テノホビル ジソプロキシルとして 245 mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、医薬品医療機器総合機構ホームページ <http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・ この薬は、抗ウイルス剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・ この薬は、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）のインテグラーゼと逆転写酵素を阻害してウイルスの増殖をおさえます。
- ・ 次の病気の人に処方されます。

HIV-1 感染症

- ・ この薬は、HIV-1 感染症に対して1剤で治療を行うものであるため、他の抗HIV薬と併用されません。
- ・ この薬を自己判断で使用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化したり効きにくくなるおそれがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- B 型慢性肝炎にかかっている人では、この薬の使用を中止すると、B 型慢性肝炎が悪化することがあります。特に進行した B 型慢性肝炎の場合は、症状が重くなることがあります。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・ 過去にスタリビルド配合錠に含まれる成分で、過敏な反応を経験したことがある人
 - ・ 次の薬を使用している人
カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン、ホスフェニトイン、リファンピシム（リファジン等）、セイヨウオトギリソウ（St. John's Wort：セント・ジョーンズ・ワート）含有食品、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩（ジヒデルゴット）、エルゴタミン酒石酸塩（クリアミン）、エルゴメトリンマレイン酸塩（エルゴメトリン）、メチルエルゴメトリンマレイン酸塩（メテルギン）、アスナプレビル（スンベブラ）、バニプレビル（バニヘップ）、シンバスタチン（リポバス）、ピモジド（オーラップ）、シルデナフィルクエン酸塩（レバチオ）、バルデナフィル塩酸塩水和物（レビトラ）、タダラフィル（アドシルカ）、ブロナンセリン（ロナセン）、アゼルニジピン（カルブロック）、リバーロキサバン（イグザレルト）、トリアゾラム（ハルシオン）、ミダゾラム（ドルミカム）
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使用する前に、医師または薬剤師に教えてください。
 - ・ 腎臓に障害のある人
 - ・ 肝臓に障害のある人
- この薬には、併用してはいけない薬や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

○ 使用量および回数

- ・ 飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

販売名	スタリビルド配合錠
一回量	1 錠
飲む回数	1 日 1 回 食事中または食直後*

* 食事がとれなかったり、食事が不規則になったりした場合でも、少しでも食べ物（軽食）をとってから飲んでください。

○ どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

○ 飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に 1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分飲んでください。

○ 多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- この薬は、患者さんやそれに代わる適切な人が、次の点について十分に理解できるまで説明を受け、同意してから使用が開始されます。
- ・ この薬は、HIV 感染症を根本的に治すものではありません。この薬を飲んでいても病気が進行する可能性がありますので、身体状況の変化は全て医師に報告してください。
- ・ この薬を長く飲んだ場合の影響については、わかりません。
- ・ この薬が、性的接触や血液を通した他者への HIV 感染の危険性を低下させるかどうかについては、証明されていません。
- ・ この薬を自己判断で使用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化したり効きにくくなるおそれがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。
- ・ この薬には、併用してはいけない薬や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- 重篤な乳酸アシドーシス（深く大きい呼吸）および脂肪沈着による重い肝腫大（羽ばたくような手のふるえ、吐き気、右上腹部の痛みや圧痛、皮膚が黄色くなる）が女性に多く報告されています。これらの副作用を思わせる症状があらわれたら、ただちに受診してください。
- この薬を含めて、HIV 感染症の薬を飲み始めた後、免疫力が回復し、日和見感染などに対する炎症反応（発熱、下痢など）があらわれたり、悪化したりすることがあります。また、自己免疫疾患（甲状腺機能亢進症、多発性筋炎、ギラン・バレー症候群、ブドウ膜炎等）があらわれることがあります。
- この薬は、HIV-1 感染症に対して 1 剤で治療を行うものであるため、他の抗 HIV 薬と併用されません。
- この薬を含めて、HIV 感染症の薬によって体の脂肪の分布が変化し、顔や手足がやせたり、おなかのまわりが大きくなったりすることがあります。
- この薬の成分の一つであるエムトリシタビンを飲んだ後で、皮膚が変色（主に手のひらに発現し、小さなしみやほくろのような変色）したとの報告があります。
- 妊婦または妊娠している可能性がある人は、医師に相談してください。
- 授乳を中止してください。
- 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを、医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
腎不全 じんふぜん	むくみ、貧血、全身のけいれん、頭痛、のどが渇く、吐き気、食欲不振、尿量が減る、無尿、血圧上昇
重度の腎機能障害 じゅうどのじんきのうしょうがい	発熱、頭痛、顔のむくみ、眼がはれぼったい、口の渇き、食欲不振、手足のむくみ、尿量が減る
膵炎 すいえん	嘔吐、吐き気、胃・おなかの激しい痛み、背中の痛み
乳酸アシドーシス にゅうさんアシドーシス	意識の低下、考えがまとまらない、嘔吐、吐き気、深く大きい呼吸、羽ばたくような手のふるえ、判断力の低下

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると、次のとおりです。

これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発熱、むくみ、貧血、全身のけいれん
頭部	意識の低下、頭痛、考えがまとまらない
顔面	顔のむくみ
眼	眼がはれぼったい
口や喉	のどが渇く、口の渇き、嘔吐、吐き気
胸部	吐き気、深く大きい呼吸
腹部	胃・おなかの激しい痛み、食欲不振、吐き気
背中	背中の痛み
手・足	羽ばたくような手のふるえ、手足のむくみ
皮膚	むくみ
尿	尿量が減る、無尿
その他	判断力の低下、血圧上昇

【この薬の形は？】

形状	長い楕円形の錠剤	
	 上面	 下面
ボトル		
直径	長径	20.0 mm
	短径	10.0 mm
厚さ	8.0 mm	
重さ	1390 mg	
色	緑色 (フィルムコート)	
識別コード	GSI-□	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	エルビテグラビル／コビスタット／エムトリシタビン／テノホビル ジソプロキシシルフマル酸塩
添加物	二酸化ケイ素, クロスカルメロース Na, ヒドロキシプロピルセルロース, 乳糖, セルロース, ラウリル硫酸 Na, ステアリン酸 Mg, ポリビニルア ルコール (部分けん化物), 青色 2 号, マクロゴール, 三二酸化鉄, 酸化 チタン, タルク

【その他】

○ この薬の保管方法は？

- ・ 直射日光と湿気を避けて、室温（1～30℃）で保管してください。
- ・ 子供の手の届かないところに保管してください。

○ 薬が残ってしまったら？

- ・ 絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・ 余った場合は、処分の方法について、薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状，使用方法，副作用などのより，詳しい質問がある場合は，主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は，下記へお問い合わせください。

製造販売会社：日本たばこ産業株式会社 医薬事業部 医薬情報部

電話：03-6635-3579

受付時間：9時00分～17時30分

（土，日，祝日，その他休業日を除く）

販売会社：鳥居薬品株式会社（<http://www.torii.co.jp>）お客様相談室

電話：0120-316-834

受付時間：9時00分～17時30分

（土，日，祝日，その他休業日を除く）