

## ワクチン接種を受ける人へのガイド

2017年11月更新

# 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

### 【このワクチンの名前は？】

販売名	ジェービックV
一般名	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン Freeze-dried, Cell Culture-derived Japanese Encephalitis Vaccine (Inactivated)

#### ワクチン接種を受ける人へのガイドについて

ワクチンの正しい理解と、重大な副反応の早期発見などに役立てていただくために、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、特に知っていただきたいことをわかりやすく記載しています。添付文書情報はPMDAホームページ「医薬品に関する情報」<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に掲載されています。

※副反応：ワクチンの副作用のこと

### 【このワクチンの効果は？】

- ・ このワクチンは、次の目的で接種されます。

#### 日本脳炎の予防

- ・ このワクチンの接種により日本脳炎に対する抗体ができ、かかりにくくなります。

### 【このワクチンの接種前に、確認すべきことは？】

- ワクチン接種を受ける人または家族の方などは、このワクチンの効果や副反応などの注意すべき点について十分理解できるまで説明を受けてください。説明に同意した上で接種を受けてください。
- 医師が問診、検温および診察の結果から、接種できるかどうか判断します。
- 次の人は、このワクチンの接種を受けることはできません。
  - ・ 明らかに発熱（通常37.5℃以上）している人
  - ・ 重篤な急性疾患にかかっている人
  - ・ 過去にこのワクチンに含まれている成分でアナフィラキシーをおこしたことがある人
  - ・ 上記以外に医師が予防接種を行うことが不適切な状態にあると判断した人

- 次の人は、医師が健康状態や体質に基づいて、接種の適否を判断します。
  - ・ 心臓や血管、腎臓、肝臓、血液の障害や発育の障害などの基礎疾患がある人
  - ・ 他のワクチンの接種を受けて、2日以内に発熱があった人や全身性の発疹などアレルギーが疑われる症状が出たことがある人
  - ・ 過去にけいれんをおこしたことがある人
  - ・ 過去に免疫に異常があると診断されたことがある人や両親や兄弟に先天性免疫不全症の人がいる人
  - ・ このワクチンに含まれている成分に対してアレルギーをおこすおそれがある人
  - ・ 高齢の人
- 妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- すでに生ワクチン\*の接種を受けている場合、生ワクチン接種4週間後からこのワクチンを接種できます。すでに不活化ワクチン\*の接種を受けている場合、不活化ワクチン接種1週間後からこのワクチンを接種できます。

\*生ワクチン、不活化ワクチンの詳細は巻末をご覧ください。

## 【このワクチンの接種スケジュールは？】

### ● 接種量および回数

初回免疫	1週間～4週間間隔で2回接種
追加免疫	初回免疫からおおむね1年経過してから接種


1回量：0.5mL（3歳未満では0.25mL）

[定期接種<sup>1</sup>]

このワクチンの定期接種スケジュールには第1期、第2期があります。

第1期：初回免疫と追加免疫の接種を受けてください。

第2期：第1期の後、1回接種を受けてください。



追加免疫：初回免疫終了後おおむね1年後に1回

■ 標準的な接種年齢

- ・ 特例として、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの人で、4回の接種が終わっていない人は、20歳になるまでの間、定期接種を受けることができます。

- ・ 個人によって接種スケジュールが異なる場合があります。
- ・ このスケジュール中に、接種を受けられなかった場合は医師に相談してください。

#### [任意接種<sup>ii</sup>]

- ・ 希望される場合には医師に相談してください。

- i 定期接種：予防接種法で定められた予防接種を、決められた年齢で受ける場合
- ii 任意接種：予防接種法で定められていない予防接種や、定期接種で定められた年齢から外れて受ける場合

- 医師が必要と認めた場合には、同時に他のワクチンの接種を受けることができます。

## 【このワクチンの接種後に気をつけなければならないことは？】

- ・ 接種当日は激しい運動をさけ、接種部位を清潔に保ってください。
- ・ 接種後は健康状態によく気をつけてください。接種部位の異常な反応や体調の変化、高熱、けいれんなどの異常を感じた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- ・ 接種後に、アナフィラキシー（皮膚のかゆみ、じんましん、息苦しい、どろき、意識の低下など）がおこることがあります。アナフィラキシーは通常接種後30分以内におこることが多いので、この間接種施設で待機するか、すぐに医師と連絡をとれるようにしておいてください。
- ・ 他の医師を受診したり、他のワクチンを接種したりする場合は、必ずこのワクチンを接種したことを医師、薬剤師または看護師に伝えてください。

## 副反応は？

特にご注意いただきたい重大な副反応と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副反応であれば、それぞれの重大な副反応ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師に相談してください。


重大な副反応	主な自覚症状
ショック	冷や汗、めまい、意識がうすれる、考えがまとまらない、血の気が引く、息切れ、判断力の低下
アナフィラキシー	からだがだるい、ふらつき、意識の低下、考えがまとまらない、ほてり、眼と口唇のまわりのはれ、しゃがれ声、息苦しい、息切れ、動悸（どろき）、

	じんましん、判断力の低下
急性散在性脳脊髄炎 きゅうせいさんざいせいのうせきず いえん	頭痛、発熱、嘔吐（おうと）、意識が混濁する、目が見えにくい、手足が動きにくい、歩きにくい、感覚が鈍い
けいれん	けいれん
血小板減少性紫斑病 けっしょうばんげんしょうせいしは んびょう	鼻血、歯ぐきの出血、皮下出血
脳炎・脳症 のうえん・のうしょう	発熱、頭痛、まひ、意識が混濁する、歩行時のふらつき、口のもつれ、物忘れ、動作が鈍い

以上の自覚症状を、副反応のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副反応ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷や汗、からだがだるい、ふらつき、発熱、感覚が鈍い、けいれん
頭部	めまい、意識がうすれる、考えがまとまらない、意識の低下、頭痛、意識が混濁する
顔面	血の気が引く、ほてり、鼻血
眼	眼のまわりのはれ、目が見えにくい
口や喉	口唇のまわりのはれ、しゃがれ声、嘔吐（おうと）、歯ぐきの出血
胸部	息切れ、息苦しい、動悸（どうき）
手・足	手足が動きにくい、歩きにくい、歩行時のふらつき
皮膚	じんましん、皮下出血
その他	判断力の低下、まひ、口のもつれ、物忘れ、動作が鈍い

## 【このワクチンの形は？】

容器の形状	性状
	白色の乾燥製剤で、添付の溶剤を加えると、無色の透明またはわずかに白濁した液剤となります。

写真はほぼ原寸大です。

## 【このワクチンに含まれているのは？】

有効成分	不活化日本脳炎ウイルス北京株
添加物	乳糖水和物、ホルマリン、L-グルタミン酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、リン酸二水素カリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、TCM-199（エドト酸四ナトリウム、リン酸三ナトリウム含）

## 【このワクチンについてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副反応などのより詳しい質問がある場合は、医師や薬剤師、看護師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。  
製造販売元：一般財団法人 阪大微生物病研究会 お問い合わせ窓口  
フリーダイヤル 0120-280-980  
受付時間 9:00～17:30（土日祝日・会社休業日を除く）  
<http://www.biken.or.jp>

発売元：田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター  
フリーダイヤル 0120-753-280  
受付時間 9:00～17:30（土日祝日・会社休業日を除く）  
<http://www.mt-pharma.co.jp>

武田薬品工業株式会社 くすり相談室  
フリーダイヤル 0120-566-587  
受付時間 9:00～17:30（土日祝日・会社休業日を除く）  
<http://www.takeda.co.jp>

【参考】 このワクチンの接種を受ける前に他のワクチンを受けている場合

- 下表右欄の生ワクチンを受けている場合は、27日以上間隔を空けてこのワクチンを接種します。

生ワクチンとは	ワクチンの例
病原体となるウイルスあるいは細菌の毒性を弱めて病原性をなくしたものを原材料として作られたワクチンです。	BCG、麻しん風しん混合（MR）、麻しん、風しん、水痘（みずぼうそう）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、経口ロタウイルス、黄熱

- 下表右欄の不活化ワクチンを受けている場合は、6日以上間隔を空けてこのワクチンを接種します。

不活化ワクチンとは	ワクチンの例
病原体となるウイルスや細菌の感染する能力を失わせた（不活化、殺菌）ものを原材料として作られたワクチンです。	不活化ポリオ、ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ（DPT-IPV）四種混合、ジフテリア・百日せき・破傷風（DPT）三種混合、ジフテリア・破傷風（DT）二種混合、破傷風トキソイド、ジフテリアトキソイド、日本脳炎、インフルエンザ、インフルエンザ菌b型（Hib）、肺炎球菌（13価結合型）、ヒトパピローマウイルス（HPV）、A型肝炎、B型肝炎、肺炎球菌（23価多糖体）、狂犬病