

ビラミューン錠 200

【この薬は？】

販売名	ビラミューン錠200 Viramune Tablets 200
一般名	ネビラピン Nevirapine
含有量 (1錠中)	200mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」
<http://www.info.pmda.go.jp/> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗ウイルス剤（非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤）と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）の逆転写酵素を阻害してウイルスの増殖をおさえます。
- ・次の病気の人に処方されます。

HIV-1感染症

- ・この薬は、他の抗HIV剤と併用されます。
- ・この薬を、自己判断で使用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化したり効きにくくなるおそれがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- この薬の使用により、重篤で死亡することもある皮膚障害があらわれることがあ

りますので、以下の点に気をつけてください。

- ・この薬の使用による皮膚障害は、投与開始後およそ18週までに（重篤な皮膚障害は投与開始後およそ6週までに）あらわれることが多いので、この期間中は特に気をつけてください。
 - ・重篤な発疹や発熱、水疱、口の中の異常、結膜炎、顔面や四肢等の腫脹、筋肉痛、関節痛、全身倦怠感を伴う発疹があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合は、ただちに医師に連絡してください。
 - ・この薬を中止した後も症状が悪化することがあるので、気をつけてください。
 - ・この薬で重篤な発疹や全身症状を伴う発疹があらわれた人は、再度この薬を飲まないでください。
- この薬の使用により、肝不全などの重篤で死亡することもある肝機能障害がおこることがあるので、以下の点に気をつけてください。
- ・使用開始前および使用開始後は定期的に肝機能検査が行われます。
 - ・検査で異常があった場合は、この薬を中止することがあります。
 - ・この薬を中止した後も症状が悪化することがあるので、気をつけてください。
 - ・この薬で肝機能障害がおこった人は、再度この薬を飲まないでください。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
- ・過去にビラミューン錠に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
 - ・この薬を使用して重篤な発疹や全身症状を伴う発疹が発現した人
 - ・重篤な肝機能障害のある人
 - ・この薬を使用して肝機能障害が発現した人
 - ・ケトコナゾール（経口剤：国内未発売）を使用している人
 - ・経口避妊薬を使用している人（避妊を目的とするホルモン療法を行っている人も含みます）
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使用する前に医師または薬剤師に教えてください。
- ・肝臓に障害のある人または過去に肝臓に障害があった人
 - ・腎臓に障害のある人または過去に腎臓に障害があった人
 - ・HIVプロテアーゼ阻害剤を使用中の人
 - ・CD4の値が高い人（女性：250/mm³以上、男性：400/mm³以上）
 - ・女性
 - ・妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
 - ・小児
 - ・高齢の人
- この薬には併用してはいけない薬〔ケトコナゾール（経口剤：国内未発売）、経口避妊薬（避妊を目的とするホルモン療法を含む）〕や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人は1日1回1錠を14日間服用し、その後は1日2錠を2回に分けて服用します。

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合には1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

むくみ、疲労、発熱、頭痛、不眠、吐気、発疹、めまい、嘔吐（おうと）などの症状があらわれることがあります。これらの症状があらわれたら、医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬は、患者さんやそれに代わる適切な人が次の点について十分に理解できるまで説明を受け、同意してから使用が開始されます。
 - ・この薬はH I V感染症を根本的に治すものではありません。この薬を飲んでいても、病気が進行する可能性がありますので、身体状況の変化は全て医師に報告してください。
 - ・この薬の主な副作用は発疹です。発疹は使用開始からおよそ18週までに（重篤な発疹は使用開始からおよそ6週までに）発現しているので、その期間中は特に注意してください。発疹が発現した場合は、ただちに担当の医師へ連絡してください。
 - ・この薬により、肝不全などの重篤な肝機能障害の発現が報告されています。
 - ・この薬が、性的接触や血液を通した他者へのH I V感染の危険性を低下させるかどうかについては証明されていません。
 - ・医師の指示どおり毎日服用してください。医師の指示がないのに使用量を変更しないでください。使用するのを忘れた場合は、気づいたときにすぐに使用し、決して2回分を一度に飲まないでください。
 - ・この薬は併用してはいけない薬や併用を注意する薬があります。使用中のすべての薬を医師に報告してください。また治療中に新たに他の薬を使用する場合には、使用する前に医師に相談してください。
 - ・この薬を使用中には経口避妊薬や他のホルモン療法を避妊目的に使用しないでください。
- ・この薬の使用中に病状が進行したら、他の薬に変更されることがあります。
- ・避妊が目的でないホルモン療法を受けている人ではホルモン療法の治療効果を確認します。
- ・CD4値が高い人では、CD4と肝機能検査が行われます。
- ・発疹が発現した人では肝機能検査が行われます。
- ・特に女性では発疹や肝機能障害の発現が高いので、異常を感じたら直ちに担当の医師に連絡してください。
- ・H I V感染症の薬によって体の脂肪の分布が変化し、顔や手足がやせたり、おなかのまわりが大きくなったりすることがあります。
- ・この薬を含めて、H I V感染症の薬を飲み始めた後、免疫力が回復し、日和見感染などに対する炎症反応（発熱、下痢など）があらわれたり悪化したりすることがあります。

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を中止してください。
- ・セイヨウトギリソウを含有する食品はこの薬の働きに影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
中毒性表皮壊死症 (Lyell 症候群) ちゅうどくせいひょう ひえししょう(ライエル しょうこうぐん)	関節の痛み、痛みのある赤い肌、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ(水疱)、からだがだるい
皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群) ひふねんまくがんしょう こうぐん(スティーブ ンス-ジョンソンしょう こうぐん)	高熱、陰部の痛み、ひどい口内炎、唇や口内のただれ、発熱、中央にむくみをともなった赤い斑点、赤い発疹、まぶたや眼の充血、食欲不振、からだがだるい、結膜のただれ
過敏症症候群 かびんしょうしょうこう ぐん	息苦しい、判断力の低下、考えがまとまらない、発熱、発疹、ふらつき、しびれ、かゆみ、意識がうすれる、汗がたくさん出る、さむけ
肝炎(劇症肝炎を 含む) かんえん(げきしょうかん えんをふくむ)	嘔吐、吐き気、からだがだるい、食欲不振、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる
肝機能障害 かんきのうしょうがい	かゆみ、からだがだるい、食欲不振、吐き気、嘔吐、白目が黄色くなる、尿が黄色い、皮膚が黄色くなる
黄疸 おうだん	尿が褐色になる、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる
肝不全 かんふぜん	羽ばたくような手のふるえ、食欲不振、吐き気、嘔吐
顆粒球減少 かりゅうきゅうげん しょう	のどの痛み、発熱
うつ病 うつびょう	やる気がおきない、気分が落ち込む、気分がふさぎ込む、不眠、気がめいる、からだがだるい
幻覚 げんかく	実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる
錯乱 さくらん	意識の混乱、意識が乱れる、考えがまとまらない


脱水症 だっすいしょう	からだがだるい、尿量が減る、下痢、のどが渇く、意識がうすれる、深く大きい呼吸、手指のふるえ、考えがまとまらない、判断力の低下
心筋梗塞 しんきんこうそく	息苦しい、急激に胸を強く押さえつけられた感じ、狭心痛、冷や汗
出血性食道潰瘍 しゅっけつせいしょくどうかいよう	みぞおちの痛み、背中の痛み、胸やけ、飲み込むときの痛み、飲み込みにくい
全身痙攣 ぜんしんけいれん	けいれん
髄膜炎 ずいまくえん	頭痛、発熱、嘔吐
アナフィラキシー 様症状 アナフィラキシーようしょうじょう	からだがだるい、しゃがれ声、じんましん、ふらつき、ほてり、意識の低下、眼と口唇のまわりのはれ、眼と口唇のまわりのはれ、考えがまとまらない、息苦しい、息切れ、動悸、判断力の低下

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだがだるい、ふらつき、さむけ、汗がたくさん出る、高熱、発熱、冷や汗、けいれん
頭部	意識の低下、意識がうすれる、考えがまとまらない、意識が乱れる、意識の混乱、頭痛
顔面	ほてり
眼	眼と口唇のまわりのはれ、白目が黄色くなる、まぶたや眼の充血、結膜のただれ
口や喉	しゃがれ声、眼と口唇のまわりのはれ、のどの痛み、嘔吐、吐き気、飲み込みにくい、飲み込むときの痛み、のどが渇く、ひどい口内炎、唇や口内のただれ
胸部	息苦しい、息切れ、動悸、吐き気、胸やけ、急激に胸を強く押さえつけられた感じ、狭心痛、深く大きい呼吸
腹部	食欲不振、吐き気、みぞおちの痛み
背中	背中の痛み
手・足	羽ばたくような手のふるえ、手指のふるえ、関節の痛み
皮膚	じんましん、皮膚が黄色くなる、かゆみ、発疹、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ(水疱)、痛みのある赤い肌、赤い発疹、中央にむくみを

部位	自覚症状
	ともなった赤い斑点
便	下痢
尿	尿が褐色になる、尿が黄色い、尿量が減る
その他	判断力の低下、やる気がおきない、気がめいる、気分がふさぎ込む、気分が落ち込む、不眠、しびれ、実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる、陰部の痛み

【この薬の形は？】

形状		
直径	長径	19.1mm
	短径	9.3mm
厚さ	6.5mm	
重さ	800mg	
色	白色（素錠）	
識別コード	54 193	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ネビラピン
添加物	結晶セルロース、乳糖、ポビドン K25、カルボキシメチルスターチナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師

にお尋ねください。

- ・ 製造販売業者：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

(<http://www.boehringer-ingenheim.co.jp/>)

DIセンター

〒141-6017 東京都品川区大崎2-1-1

ThinkPark Tower

フリーダイヤル：0120-189-779

(受付時間) 9:00～18:00

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)