

Kracie

※※2015年3月改訂（第4版）

※2010年10月改訂

貯 法：直射日光をさけ、吸湿注意。

開封後は密栓保存。

使用期間：3年（使用期限は外箱・ラベルに表示）

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	(61AM) 1153
薬価収載	2007.7
販売開始	2007.7 *1986.10

*旧販売名による

漢方製剤

クラシエ 麻黄湯エキス細粒

マ オウ トウ

KB-27 EK-27

〔組成・性状〕

※※1. 組成

本薬1日量（6.0g）中

日局マオウ ……………5.0g

日局キョウニン ……………5.0g

日局ケイヒ ……………4.0g

日局カンゾウ ……………1.5g

上記の混合生薬より抽出した日局麻黄湯エキス
1,600mgを含有する。

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局結
晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素を
含有する。

2. 製剤の性状

剤形 (色・形状)	内容量 (1包中)	識別記号
淡かつ色の細粒で、特異なにおいがあり、味はわずかに甘い。	3.0g	KB-27
	2.0g	EK-27

〔効能・効果〕

風邪のひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、
身体のふしぶしが痛い場合の次の諸症：
感冒、鼻かぜ

〔用法・用量〕

通常、成人1日6.0gを2～3回に分割し、食前又は食間
に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1)病後の衰弱期、著しく体力の衰えている患者〔副作用
があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれ
がある。〕
- (2)著しく胃腸の虚弱な患者〔食欲不振、胃部不快感、悪
心、嘔吐等があらわれることがある。〕
- (3)食欲不振、悪心、嘔吐のある患者〔これらの症状が悪
化するおそれがある。〕
- (4)発汗傾向の著しい患者〔発汗過多、全身脱力感等があら
われることがある。〕
- (5)狭心症、心筋梗塞等の循環器系の障害のある患者、又
はその既往歴のある患者

(6)重症高血圧症の患者

(7)高度の腎障害のある患者

(8)排尿障害のある患者

(9)甲状腺機能亢進症の患者

〔(5)～(9)：これらの疾患及び症状が悪化するおそれがある。〕

2. 重要な基本的注意

(1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）
を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察
し、症状・所見の改善が認められない場合には、継
続投与を避けること。

(2)本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウ
ム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場
合には投与を中止すること。

(3)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複
に注意すること。

3. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(1)マオウ含有製剤 (2)エフェドリン類含有製剤 (3)モノアミン酸化酵素 (MAO)阻害剤 (4)甲状腺製剤 チロキシン リオチロニン (5)カテコールアミン製剤 アドレナリン イソプレナリン (6)キサントシン系製剤 テオフィリン ジプロフィリン	不眠、発汗過多、 頻脈、動悸、全身 脱力感、精神興奮 等があらわれやす くなるので、減量 するなど慎重に投 与すること。	交感神経刺激作用 が増強されること が考えられる。
(7)カンゾウ含有製剤 (8)グリチルリチン酸及び その塩類を含有する 製剤	偽アルドステロン 症があらわれやす くなる。また、低カ リウム血症の結果 として、ミオパチー があらわれやす くなる。（「重大な副作 用」の項参照）	グリチルリチン 酸は尿細管での カリウム排泄促 進作用があるた め、血清カリウ ム値の低下が促 進されることが 考えられる。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

(1) 重大な副作用

1) 偽アルドステロン症：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。

2) ミオパチー：低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。

※(2) その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、発赤、瘙痒等
自律神経系	不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮等
肝臓	肝機能異常（AST(GOT)、ALT(GPT)等の上昇)
消化器	食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐等
泌尿器	排尿障害等

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

5. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。

7. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

[包装]

クラシエ麻黄湯エキス細粒

1. **KB-27** 3.0g×28包
3.0g×168包
2. **EK-27** 2.0g×42包
2.0g×294包
500g

[文献請求先]

クラシエ薬品株式会社 医薬学術部
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20
TEL 03(5446)3352 FAX 03(5446)3371

[製品情報お問合せ先]

クラシエ薬品株式会社 お客様相談センター
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20
TEL 03(5446)3334 FAX 03(5446)3374
〈受付時間〉10:00～17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)

発売元

クラシエ薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)

製造販売元

クラシエ製薬株式会社
東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)