

深在性真菌症治療剤

処方箋医薬品<sup>注1)</sup>

※日本薬局方 フルコナゾール注射液

**フルコナゾール静注50mg**〔NP〕  
**フルコナゾール静注100mg**〔NP〕  
**フルコナゾール静注200mg**〔NP〕

FLUCONAZOLE INTRAVENOUS

貯 法：室温保存

使用期限：容器等に記載

注 意：「取扱い上の注意」参照

	50mg	100mg	200mg
承認番号	22500AMX00819	22500AMX00820	22500AMX00837
薬価収載	2013年12月	2013年12月	2013年12月
販売開始	2003年7月	2003年7月	2003年7月
効能追加	2012年3月	2012年3月	2012年3月

禁忌（次の患者には投与しないこと）

- ※※
- 次の薬剤を投与中の患者：トリアゾラム、エルゴタミン、ジヒドロエルゴタミン、キニジン、ピモジド、アスナプレビル、ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル配合錠（「3. 相互作用」の項参照）
  - 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
  - 妊婦又は妊娠している可能性のある患者（「6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

【組成・性状】

1. 組成

販売名	フルコナゾール 静注50mg〔NP〕	フルコナゾール 静注100mg〔NP〕	フルコナゾール 静注200mg〔NP〕
容量	50mL	50mL	100mL
有効成分 (1容器中)	日本薬局方 フルコナゾール		
	50mg	100mg	200mg
添加物 (1容器中)	等張化剤、pH調整剤		

2. 製剤の性状

	フルコナゾール 静注50mg〔NP〕	フルコナゾール 静注100mg〔NP〕	フルコナゾール 静注200mg〔NP〕
性状	無色澄明の水溶性注射液		
容器	プラスチックバッグ		
pH	5.0～7.0		
浸透圧比 (生理食塩液に対する比)	約1		

【効能・効果】

- カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症  
真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症、尿路真菌症、  
真菌髄膜炎
- 造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防

【用法・用量】

○成人

- ・カンジダ症  
通常、成人にはフルコナゾールとして50～100mgを1日1回静脈内に投与する。
  - ・クリプトコッカス症  
通常、成人にはフルコナゾールとして50～200mgを1日1回静脈内に投与する。
- なお、重症又は難治性真菌感染症の場合には、1日量として400mgまで増量できる。

・造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防  
成人には、フルコナゾールとして400mgを1日1回静脈内に投与する。

○小児

- ・カンジダ症  
通常、小児にはフルコナゾールとして3mg/kgを1日1回静脈内に投与する。
  - ・クリプトコッカス症  
通常、小児にはフルコナゾールとして3～6mg/kgを1日1回静脈内に投与する。
- なお、重症又は難治性真菌感染症の場合には、1日量として12mg/kgまで増量できる。
- ・造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防  
小児には、フルコナゾールとして12mg/kgを1日1回静脈内に投与する。
- なお、患者の状態に応じて適宜減量する。

ただし、1日量として400mgを超えないこと。

○新生児

生後14日までの新生児には、フルコナゾールとして小児と同じ用量を72時間毎に投与する。  
生後15日以降の新生児には、フルコナゾールとして小児と同じ用量を48時間毎に投与する。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防

- 好中球減少症が予想される数日前から投与を開始することが望ましい。
- 好中球数が1,000/mm<sup>3</sup>を超えてから7日間投与することが望ましい。

※※【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 1) 薬物過敏症の既往歴のある患者
- 2) 腎障害のある患者〔血中濃度が持続するので、投与量を減ずるか、投与間隔をあけて使用すること。〕
- 3) 肝障害のある患者〔肝障害を悪化させることがある。〕
- 4) 心疾患又は電解質異常のある患者〔心室頻拍 (torsades de pointesを含む)、QT延長、心室細動、房室ブロック、徐脈等があらわれることがある。〕（「4. 副作用 1) 重大な副作用」の項参照）
- 5) ワルファリンを投与中の患者（「2. 重要な基本的注意」及び「3. 相互作用」の項参照）

2. 重要な基本的注意

- 1) 腎障害のある患者に投与する場合は、投与前にクレアチニン・クリアランス試験を行い、投与量及び投与間隔に十分注意すること。

注1) 注意－医師等の処方箋により使用すること

- 2) 本剤とワルファリンとの併用において、ワルファリンの作用が増強し、著しいINR上昇を来した症例が報告されている。本剤投与開始にあたっては、あらかじめワルファリン服用の有無を確認し、ワルファリンと併用する場合は、プロトロンビン時間測定及びトロンボテストの回数を増やすなど慎重に投与すること。(「3. 相互作用」の項参照)
- 3) 本剤の投与に際しては、適宜、血液検査、腎機能・肝機能検査、血中電解質検査等を行うことが望ましい。
- 4) 本剤の投与に際しては、アレルギー既往歴、薬物過敏症等について十分な問診を行うこと。

※※3. 相互作用

本剤は、CYP2C9、2C19及び3A4を阻害する。

1) 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
トリアゾラム (ハルシオン等)	トリアゾラムの代謝遅滞による血中濃度の上昇、作用の増強及び作用時間延長の報告がある。	本剤は、これらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
エルゴタミン (クリアミン配合錠) エジドロエルゴタミン (ジヒデルゴット等)	アゾール系抗真菌剤等のCYP3A4を阻害する薬剤とエルゴタミンとの併用により、エルゴタミンの血中濃度が上昇し、血管攣縮等の副作用を起こすおそれがある。	
キニジン (硫酸キニジン) ピモジド (オーラップ)	これらの薬剤の血中濃度が上昇することにより、QT延長、torsades de pointesを発現するおそれがある。	
※※ アスナプレビル (スンベプラ) ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル配合錠 (ジメンシー配合錠)	これらの薬剤の血中濃度が上昇することにより、肝胆道系の副作用が発現し、また重症化するおそれがある。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。

2) 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ワルファリン	プロトロンビン時間の延長、著しいINR上昇及び出血傾向（挫傷、鼻出血、消化管出血、血尿、下血等）の報告がある。 (「2. 重要な基本的注意」の項参照)	本剤は、これらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP2C9を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
フェニトイン イブプロフェン フルピプロフェン	これらの薬剤の血中濃度上昇の報告がある。	
セレコキシブ	セレコキシブの血中濃度が上昇することがある。本剤を使用中の患者にはセレコキシブの投与を低用量から開始すること。	

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ロサルタン	ロサルタンの血中濃度上昇、及び活性代謝物であるカルボン酸体の血中濃度減少の報告がある。	本剤は、ロサルタンの肝臓における主たる代謝酵素であるCYP2C9を阻害するので、併用により活性代謝物であるカルボン酸体の血中濃度が減少することがある。
HMG-CoA還元酵素阻害薬	フルバスタチン  アトルバスタチン シンバスタチン 等	これらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。  本剤は、これらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP2C9を阻害するので、併用によりフルバスタチンの血中濃度が上昇することがある。  本剤は、これらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
カルバマゼピン	カルバマゼピンの血中濃度が上昇し、悪心、嘔吐、めまい、複視等が発現したとの報告がある。	本剤は、これらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
ミダゾラム エプレレノン メサドン	これらの薬剤の血中濃度上昇の報告がある。	本剤は、これらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
カルシウム拮抗薬・ニフェジピン等 ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍薬・ビンクリスチン・ビンブラスチン エリスロマイシン	これらの薬剤の血中濃度上昇のおそれがある。	本剤は、これらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
タクロリムス水和物 シクロスポリン	これらの薬剤の血中濃度上昇の報告がある。 また、併用により腎障害の報告がある。	本剤は、これらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
リファブチン	リファブチンのAUC上昇の報告があり、リファブチンの作用が増強するおそれがある。	本剤は、これらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
リトナビル サキナビル オキシコドン	これらの薬剤のAUC上昇の報告がある。	本剤は、これらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
フェンタニル	フェンタニルの血中濃度上昇のおそれがある。	本剤は、これらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の代謝が遅れることがある。
リバーロキサバン	リバーロキサバンの血中濃度が上昇したとの報告がある。	本剤は、これらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の代謝が遅れることがある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
テオフィリン	テオフィリンの血中濃度上昇の報告がある。	本剤は、これらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるチトクロームP450を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
経口避妊薬	エチニルエストラジオール、レボノルゲストレルの血中濃度上昇の報告がある。	
スルホニル尿素系血糖降下薬 ・クロルプロバミド ・グリベンクラミド ・トルブタミド等	スルホニル尿素系血糖降下薬の血中濃度上昇の報告がある。 また、併用により低血糖の報告がある。	
ナテグリニド	ナテグリニドのAUC上昇及び血中濃度半減期の延長の報告がある。	
トレチノイン	中枢神経系の副作用が発現するおそれがある。	
ジアゼパム	ジアゼパムのAUC上昇及び血中濃度半減期の延長の報告がある。	本剤は、これらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4及び2C19を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
トファシチニブ	トファシチニブのAUCが79%、Cmaxが27%増加したとの報告がある。	
シクロホスファミド	ビリルビンの上昇、クレアチニンの上昇の報告がある。	本剤は、シクロホスファミドの肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4及び2C9を阻害するので、併用によりシクロホスファミドの血中濃度が上昇することがある。
アミトリプチリン ノルトリプチリン	これらの薬剤の作用が増強するおそれがある。	本剤は、これらの薬剤の代謝を阻害するので、これらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
ジドブジン	ジドブジンの血中濃度上昇の報告がある。	
リファンピシン	本剤の血中濃度の低下及び血中濃度半減期の減少の報告がある。	リファンピシンは、代謝酵素であるチトクロームP450を誘導する。その結果、本剤の肝代謝が増加すると考えられる。
三酸化ヒ素	QT延長、心室頻拍 (torsades de pointesを含む) を起こすおそれがある。	本剤及び三酸化ヒ素は、いずれもQT延長、心室頻拍 (torsades de pointesを含む) を起こすことがある。

#### 4. 副作用

本剤は、副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

##### 1) 重大な副作用（頻度不明）

###### (1) ショック、アナフィラキシー

ショック、アナフィラキシー（血管浮腫、顔面浮腫、そう痒等）を起こすことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適

切な処置を行うこと。

- (2) 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）  
中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### ※※(3) 薬剤性過敏症症候群<sup>1)</sup>

初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、ヒトヘルペスウイルス6（HHV-6）等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。

##### (4) 血液障害

無顆粒球症、汎血球減少症、血小板減少、白血球減少、貧血等の重篤な血液障害があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### (5) 急性腎不全等の重篤な腎障害

急性腎不全等の重篤な腎障害が報告されているので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

##### (6) 肝障害

黄疸、肝炎、胆汁うっ滞性肝炎、肝壊死、肝不全等の肝障害が報告されており、これらの症例のうち死亡に至った例も報告されている。これらの発症と1日投与量、治療期間、患者の性別・年齢との関連性は明らかではない。本剤による肝障害は通常、投与中止により回復している。投与にあたっては、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### (7) 意識障害

錯乱、見当識障害等の意識障害があらわれることがあるので、このような症状が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

##### (8) 痙攣

痙攣等の神経障害があらわれることがあるので、このような症状が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

##### (9) 高カリウム血症

高カリウム血症があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、電解質補正等の適切な処置を行うこと。

##### (10) 心室頻拍、QT延長、不整脈

心室頻拍 (torsades de pointesを含む)、QT延長、心室細動、房室ブロック、徐脈等があらわれることがあるので、定期的に心電図検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### (11) 間質性肺炎

間質性肺炎があらわれることがあるので、発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常（捻髪音）等が認められた場合には、速やかに胸部X線等の検査を実施し、本剤の投与を中止するとともに、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

##### (12) 偽膜性大腸炎等の重篤な大腸炎

偽膜性大腸炎等の重篤な大腸炎（初期症状：発熱、腹痛、頻回の下痢）があらわれることがあるので観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

## 2) その他の副作用

次のような副作用が認められた場合は、必要に応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。

種類\頻度	頻度不明
肝臓	AST (GOT)、ALT (GPT)、Al-P、LDH、ビリルビンの上昇、黄疸
皮膚	発疹 <sup>注2)</sup> 、剥脱性皮膚炎
消化器	嘔気、食欲不振、下痢、腹痛、嘔吐、口渇、しゃっくり、腹部不快感、消化不良、鼓腸放屁
精神・神経系	頭痛、手指のこわばり、めまい、傾眠、振戦
腎臓	BUNの上昇、クレアチニンの上昇、乏尿
代謝異常	低カリウム血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、高血糖
血液	好酸球増多、好中球減少
※※ その他	発熱 <sup>注2)</sup> 、浮腫、脱毛、倦怠感、熱感、血管痛、味覚倒錯、副腎機能不全

注2) 発現した場合には投与を中止すること。

## 5. 高齢者への投与

本剤は主として腎臓から排泄されるが、高齢者では腎機能が低下していることが多いため高い血中濃度が持続するおそれがあるので、用量並びに投与間隔に留意するなど慎重に投与すること。

## 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- 1) 催奇形性を疑う症例報告があるので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。
- 2) 母乳中に移行することが認められているので、授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。

## 7. 小児等への投与

新生児においては、腎機能が未熟なため血中濃度半減期が延長することから、投与間隔に留意すること。

## 8. 過量投与

### 1) 症状

- (1) 外国の癌患者での過量投与（フルコナゾール1, 200～2, 000mg/日、経口投与）の症例報告では、フルコナゾール1, 600mg/日投与例において、肝機能検査値上昇がみられた。また、2, 000mg/日投与例において、中枢神経系障害（錯乱、嗜眠、見当識障害、不眠、悪夢、幻覚）、多形性紅斑、悪心・嘔吐、肝機能検査値上昇等がみられたとの報告がある。
- (2) フルコナゾール8, 200mg経口摂取後、幻覚、妄想行動の症状があらわれ、48時間の経過観察が行われた結果、症状は回復したとの報告がある（自殺企図例）。

### 2) 処置

(1)、(2)とも対症療法を行う。フルコナゾールは、大部分が腎から排泄される。3時間の血液透析により、約50%が血清より除去される。

## 9. 適用上の注意

### 1) 調製時

本剤は生理食塩液に溶解してあるため、注射用アムホテリシンBと併用すると白濁を生ずるので混注を避けること。

### 2) 投与速度

静注する場合は、1分間に10mLを超えない速度で投与することが望ましい。

## 【薬効薬理】

アゾール系抗真菌薬で、真菌細胞膜の主成分であるエルゴステロールの合成を阻害し膜機能を障害するが、作用機序はラノステロールC14 $\alpha$ 脱メチル化酵素の阻害である。<sup>2)</sup>

## 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：フルコナゾール (Fluconazole)

略号：FLCZ


化学名：2-(2, 4-Difluorophenyl)-1, 3-bis(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl)propan-2-ol

分子式：C<sub>13</sub>H<sub>12</sub>F<sub>2</sub>N<sub>6</sub>O

分子量：306.27

融点：137～141℃

構造式：



性状：・白色～微黄白色の結晶性の粉末である。

・エタノール (99.5) にやや溶けやすく、水に溶けにくい。

・希塩酸に溶ける。

## 【取扱い上の注意】

### 1. プラスチックバッグ製品に関する注意

- 1) プラスチックバッグの外袋の内側に液滴が認められる場合や、内容液に着色又は混濁等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 2) ゴム栓部のシールフィルムが万一はがれているときは使用しないこと。
- 3) 輸液セットの針はゴム栓の穿刺位置に、まっすぐに刺すこと。斜めに刺すと針がプラスチックバッグの首部を貫通し、液漏れを起こすことがある。
- 4) 容器の液目盛りは、およその目安として使用すること。

### 2. 安定性試験

#### 1) フルコナゾール静注50mg「NP」

最終包装製品を用いた長期保存試験（25℃、3年間）の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、フルコナゾール静注50mg「NP」は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。<sup>3)</sup>

#### 2) フルコナゾール静注100mg「NP」

最終包装製品を用いた長期保存試験（25℃、3年間）の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、フルコナゾール静注100mg「NP」は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。<sup>4)</sup>

#### 3) フルコナゾール静注200mg「NP」

最終包装製品を用いた長期保存試験（25℃、3年間）の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、フルコナゾール静注200mg「NP」は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。<sup>5)</sup>

## 【包装】

フルコナゾール静注50mg「NP」：50mL×5袋

フルコナゾール静注100mg「NP」：50mL×5袋

フルコナゾール静注200mg「NP」：100mL×5袋

## ※※【主要文献】


※※1) 厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬剤性過敏症候群

※※2) 第十七改正日本薬局方解説書

3) ニプロ (株)：社内資料 安定性試験 (静注50mg)

4) ニプロ (株)：社内資料 安定性試験 (静注100mg)

5) ニプロ (株)：社内資料 安定性試験 (静注200mg)



**【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】**

主要文献欄に記載の社内資料につきましても下記にご請求  
ください。

ニプロ株式会社 医薬品情報室

〒531-8510 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

☎ 0120-226-898

FAX 06-6375-0177



製造販売 ニプロ株式会社  
大阪市北区本庄西3丁目9番3号