

## 合成カルシトニン誘導体制剤

※※ 劇薬、処方せん医薬品<sup>注1)</sup>

# エカルトニン<sup>®</sup>注40

ECALTONIN INJECTION 40

(エルカトニン注射液)

貯 法：室温保存  
使用期限：容器等に記載  
注 意：「取扱以上の注意」参照

承認番号	20700AMZ00792
薬価収載	1996年7月
販売開始	1996年10月

### 禁忌（次の患者には投与しないこと）

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 妊娠末期の患者（「6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

### ※【組成・性状】

#### 1. 組成

販売名	エカルトニン注40
容量	1 mL
有効成分 (1管中)	日本薬局方 エルカトニン 40エルカトニン単位
※ 添加物 (1管中)	リン酸水素ナトリウム水和物 1.0mg
	無水リン酸二水素ナトリウム 0.862mg
	等張化剤、pH調整剤

#### 2. 製剤の性状

性状	無色澄明の水性注射液
容器	無色のガラスアンプル
pH	5.0～6.5
浸透圧比 (生理食塩液に対する比)	約1

### 【効能・効果】

- 高カルシウム血症
- 骨ページェット病

### 【用法・用量】

- 高カルシウム血症の場合  
通常、成人には1回エルカトニンとして40エルカトニン単位を1日2回朝晩に筋肉内注射又は点滴静注する。点滴静注においては希釈後速やかに使用し、1～2時間かけて注入する。  
なお、年齢及び血中カルシウムの変動により適宜増減する。
- 骨ページェット病の場合  
通常、成人には1回エルカトニンとして40エルカトニン単位を原則として1日1回筋肉内注射する。

### ※【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
  - 1) 発疹（紅斑、膨疹等）等の過敏症状を起こしやすい体質の患者
  - 2) 気管支喘息又はその既往歴のある患者〔喘息発作を誘発するおそれがある。〕
2. 重要な基本的注意
  - 1) 本剤はポリペプチド製剤であり、ショックを起こすこ

とがあるので、アレルギー既往歴、薬物過敏症等について十分な問診を行うこと。

- 2) ラットに1年間大量皮下投与した慢性毒性試験において、下垂体腫瘍の発生頻度の増加がみられたことが報告されているので、長期にわたり漫然と投与しないこと。（「9. その他の注意」の項参照）
- 3) 本剤の投与後初期において血清カルシウム濃度あるいは臨床症状の改善がみられない場合には、速やかに他の治療方法に変更すること。（「9. その他の注意」の項参照）

#### 3. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ビスホスホン酸塩系骨吸収抑制剤・パミドロン酸二ナトリウム 等	血清カルシウムが急速に低下するおそれがある。高度の低カルシウム血症があらわれた場合には投与を中止し、注射用カルシウム剤の投与等適切な処置を行うこと。	両剤のカルシウム低下作用により、血清カルシウムが急速に低下するおそれがある。

#### 4. 副作用

本剤は、副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

##### 1) 重大な副作用（頻度不明）

###### (1) ショック、アナフィラキシー様症状

ショック、アナフィラキシー様症状を起こすことがあるので、観察を十分に行い、血圧低下、気分不良、全身発赤、蕁麻疹、呼吸困難、咽頭浮腫等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

###### (2) テタニー

低カルシウム血症性テタニーを誘発することがあるので、症状があらわれた場合には投与を中止し、注射用カルシウム剤の投与等適切な処置を行うこと。

###### (3) 喘息発作

喘息発作を誘発することがあるので、観察を十分に行い、症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。（「1. 慎重投与」の項参照）

###### (4) 肝機能障害、黄疸

AST (GOT)、ALT (GPT)、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

## 2) その他の副作用

種類\頻度	頻度不明
過敏症 <sup>注2)</sup>	発疹、蕁麻疹
循環器	顔面潮紅、熱感、胸部圧迫感、動悸、血圧上昇、血圧低下
※ 消化器	悪心、嘔吐、食欲不振、胸やけ、腹痛、腹部膨満感、下痢、口渇、口内炎
神経系	めまい、ふらつき、頭痛、耳鳴、視覚異常（かすみ目等）、しびれ感、口内しびれ感
肝臓	AST (GOT)・ALT (GPT) 上昇
電解質代謝	低ナトリウム血症、低リン血症
注射部位	疼痛、発赤、腫脹
※ その他	そう痒感、頻尿、浮腫、咽喉部異和感（咽喉部ハッカ様爽快感等）、発熱、悪寒、脱力感、全身倦怠感、発汗、赤血球減少、ヘモグロビン減少、BUN上昇、Al-P上昇、乳房肥大、乳房痛、あくび、尿白濁

注2) このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。

## 5. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているため、用量に注意すること。

## 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。〔妊婦、産婦、授乳婦等への投与に関する安全性は確立していない。また、動物試験（ラット）で、乳汁分泌量が減少し、新生児の体重増加の抑制が報告されている。〕

2) 妊娠末期の婦人には投与しないこと。〔動物試験（ラット）で、本剤を妊娠末期の母体に静脈内投与すると、血清カルシウムの急激な低下、テタニー様症状の発現が認められたことが報告されている。〕

## 7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない（使用経験が少ない）。

## 8. 適用上の注意

### 1) 筋肉内投与時

筋肉内注射にあたっては、組織・神経等への影響を避けるため、下記の点に配慮すること。

- (1) 神経走行部位を避けるよう注意すること。
- (2) 繰り返し注射する場合には、例えば左右交互に注射するなど、注射部位を変えて行うこと。
- (3) 注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり、血液の逆流をみた場合には、直ちに針を抜き、部位を変えて注射すること。

### 2) 点滴静脈内投与時

点滴静注にあたっては、下記の点に配慮すること。

- (1) 本剤を希釈する場合は、通常「日局」生理食塩液を始めとする各種電解質を含む輸液で行うこと（電解質を含まない輸液を使用した場合、本剤の容器への吸着が認められており含量が低下する）。
- (2) 含量低下は時間経過と共に大きくなるので、希釈後速やかに使用すること。

### 3) アンブルカット時

本剤は、ワンポイントカットアンブルを使用しているため、アンブル頭部のマークを上にして反対側（下の方向）に軽く力を加えてカットすること。なお、アンブルカット時の異物混入を避けるため、首部の周りをエタノール綿等で清拭すること。

## 9. その他の注意

- 1) ラット（SD系）に1年間大量皮下投与した慢性毒性試験において、下垂体腫瘍の発生頻度の増加がみられたことが報告されている。
- 2) マウスに92週間大量皮下投与した癌原性試験において、癌原性はみられなかったことが報告されている。
- 3) 原発性副甲状腺機能亢進症の場合は、他の原疾患による高カルシウム血症に比べて効果が劣ることが臨床試験により示されている。

## 【薬効薬理】

破骨細胞の骨吸収機能を抑制するとともに、骨からCaの血中への移行を抑制することにより、血中Ca濃度を低下させると考えられている。

## 【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：エルカトニン（Elcatonin）

化学名：1-Butyric acid-7-(L-2-aminobutyric acid)-26-L-aspartic acid-27-L-valine-29-L-alaninecalcitonin (salmon)

分子式：C<sub>148</sub>H<sub>244</sub>N<sub>42</sub>O<sub>47</sub>

分子量：3363.77

構造式：



His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asp-Val-Gly-Ala-Gly-Thr-Pro-NH<sub>2</sub>

- 性状：・白色の粉末である。  
 ・水に極めて溶けやすく、エタノール（95）に溶けやすく、アセトニトリルにほとんど溶けない。  
 ・吸湿性である。  
 ・水溶液（1→500）のpHは4.5～7.0である。

## 【取扱い上の注意】

### 安定性試験

最終包装製品を用いた加速試験（40℃、相対湿度75%、6カ月）の結果、エルカトニン注40は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。<sup>1)</sup>

## 【包装】

1 mL×10管

## 【主要文献】

- 1) ニプロファーマ（株）：社内資料（安定性試験）

## 【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献欄に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

ニプロファーマ株式会社 製品情報室  
 〒541-0045 大阪市中央区道修町2丁目2番7号  
 ☎ 0120-226-898  
 FAX 06-6231-9849

®登録商標

製造販売  
 **ニプロファーマ株式会社**  
 大阪市中央区道修町2丁目2番7号