

## 医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2013 に準拠して作成

マクロライド系抗生物質製剤  
日本薬局方 クラリスロマイシン錠

# クラリスロマイシン錠 200mg「杏林」

CLARITHROMYCIN Tablets 200mg “KYORIN”

剤 形	フィルムコーティング錠
製 剤 の 規 制 区 分	処方箋医薬品 <sup>注)</sup> 注) 注意－医師等の処方箋により使用すること
規 格 ・ 含 量	1錠中、日局クラリスロマイシン 200mg(力価)を含有
一 般 名	和名：クラリスロマイシン(JAN) 洋名：Clarithromycin(JAN、INN)
製 造 販 売 承 認 年 月 日 薬価基準収載・発売年月日	製造販売承認年月日：2012年 2月23日（販売名変更による） 薬価基準収載年月日：2012年12月14日（販売名変更による） 発 売 年 月 日：2006年 7月 7日
開 発 ・ 製 造 販 売 ( 輸 入 ) ・ 提 携 ・ 販 売 会 社 名	製造販売元：キョーリンリメディオ株式会社 販 売 元：富士フィルムファーマ株式会社
医 薬 情 報 担 当 者 の 連 絡 先	
問 い 合 わ せ 窓 口	富士フィルムファーマ株式会社 お客様相談室 TEL：0120-121210 FAX：03-6418-3880 医療関係者向けホームページ <a href="http://ffp.fujifilm.co.jp">http://ffp.fujifilm.co.jp</a>

本 IF は 2018 年 5 月改訂の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の添付文書情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ <http://www.pmda.go.jp/>にてご確認下さい。

# I F 利用の手引きの概要

－日本病院薬剤師会－

## 1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和 63 年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第 2 小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、I F と略す）の位置付け並びに I F 記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会において I F 記載要領の改訂が行われた。

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会において新たな I F 記載要領 2008 が策定された。

I F 記載要領 2008 では、I F を紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF 等の電磁的データとして提供すること（e-I F）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版の e-I F が提供されることとなった。

最新版の e-I F は、（独）医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-I F を掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせて e-I F の情報を検討する組織を設置して、個々の I F が添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008 年より年 4 回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、I F 記載要領の一部改訂を行い I F 記載要領 2013 として公表する運びとなった。

## 2. I F とは

I F は「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等は I F の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された I F は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

### 【I F の様式】

- ①規格は A 4 判、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ② I F 記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「I F 利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2 頁にまとめる。

### 【 I F の作成】

- ① I F は原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ② I F に記載する項目及び配列は日病薬が策定した I F 記載要領に準拠する。
- ③ 添付文書の内容を補完するとの I F の主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④ 製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤ 「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」（以下、「 I F 記載要領 2013」と略す）により作成された I F は、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（ P D F ）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

### 【 I F の発行】

- ① 「 I F 記載要領 2013」は、平成 25 年 10 月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ② 上記以外の医薬品については、「 I F 記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③ 使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合には I F が改訂される。

## 3. I F の利用にあたって

「 I F 記載要領 2013」においては、 P D F ファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体の I F については、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、 I F の原点を踏まえ、医療現場に不足している情報や I F 作成時に記載し難い情報等については製薬企業の M R 等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、 I F の利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、 I F が改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、 I F の使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

## 4. 利用に際しての留意点

I F を薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。 I F は日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、 I F があくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013 年 4 月改訂)

# 目 次


I. 概要に関する項目	1	VII. 薬物動態に関する項目	15
1. 開発の経緯	1	1. 血中濃度の推移・測定法	15
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	2. 薬物速度論的パラメータ	16
II. 名称に関する項目	2	3. 吸収	16
1. 販売名	2	4. 分布	16
2. 一般名	2	5. 代謝	17
3. 構造式又は示性式	2	6. 排泄	17
4. 分子式及び分子量	2	7. トランスポーターに関する情報	17
5. 化学名(命名法)	2	8. 透析等による除去率	17
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	2	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目	18
7. CAS 登録番号	2	1. 警告内容とその理由	18
III. 有効成分に関する項目	3	2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)	18
1. 物理化学的性質	3	3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	18
2. 有効成分の各種条件下における安定性	3	4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	18
3. 有効成分の確認試験法	3	5. 慎重投与内容とその理由	18
4. 有効成分の定量法	3	6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	18
IV. 製剤に関する項目	4	7. 相互作用	19
1. 剤形	4	8. 副作用	23
2. 製剤の組成	4	9. 高齢者への投与	27
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	4	10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	27
4. 製剤の各種条件下における安定性	5	11. 小児等への投与	28
5. 調製法及び溶解後の安定性	6	12. 臨床検査結果に及ぼす影響	28
6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	6	13. 過量投与	28
7. 溶出性	6	14. 適用上の注意	28
8. 生物学的試験法	9	15. その他の注意	29
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	9	16. その他	29
10. 製剤中の有効成分の定量法	9	IX. 非臨床試験に関する項目	30
11. 力価	9	1. 薬理試験	30
12. 混入する可能性のある夾雑物	9	2. 毒性試験	30
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	9	X. 管理的事項に関する項目	31
14. その他	9	1. 規制区分	31
V. 治療に関する項目	10	2. 有効期間又は使用期限	31
1. 効能又は効果	10	3. 貯法・保存条件	31
2. 用法及び用量	11	4. 薬剤取扱い上の注意点	31
3. 臨床成績	12	5. 承認条件等	31
VI. 薬効薬理に関する項目	14	6. 包装	31
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	14	7. 容器の材質	31
2. 薬理作用	14	8. 同一成分・同効薬	31
		9. 国際誕生年月日	31
		10. 製造販売承認年月日及び承認番号	32
		11. 薬価基準収載年月日	32

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容.....	32
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容 .....	33
14. 再審査期間 .....	33
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報.....	33
16. 各種コード.....	33
17. 保険給付上の注意 .....	33
<b>XI. 文献</b> .....	<b>34</b>
1. 引用文献 .....	34
2. その他の参考文献.....	34
<b>XII. 参考資料</b> .....	<b>35</b>
1. 主な外国での発売状況.....	35
2. 海外における臨床支援情報 .....	35
<b>XIII. 備考</b> .....	<b>36</b>
1. その他の関連資料.....	36

# I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯	<p>本剤は、後発医薬品として医薬発第 481 号(平成 11 年 4 月 8 日)に基づき、規格及び試験方法を設定、加速試験、生物学的同等性試験を行い承認申請し、2006 年 3 月に承認を取得、2006 年 7 月にクラリスロマイシン錠 200mg「PH」として発売に至った。その後、2012 年 12 月に販売名を「クラリスロマイシン錠 200mg「杏林」」に名称変更した。2010 年 4 月より富士フイルムファーマ株式会社でも販売されている。</p>
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	<p>1)細菌の 70S リボソームの 50S サブユニットと結合し、タンパク合成を阻害することにより、抗菌作用を発揮する。<sup>1)</sup></p> <p>2)ブドウ球菌属、レンサ球菌属などの好気性グラム陽性菌、ブランハメラ・カタラーリス、インフルエンザ菌、百日咳菌、カンピロバクター属などの一部のグラム陰性菌、ペプトストレプトコッカス属、マイコプラズマ属、クラミジア属及び <i>Mycobacterium avium complex</i> に対する抗菌作用は他のマクロライド系抗生物質と同等以上であり、良好な組織移行性を反映して、各種感染症モデルですぐれた防御及び治療効果を示す。<sup>1)</sup></p> <p>3)重大な副作用として、ショック、アナフィラキシー、QT 延長、心室頻拍 (Torsades de pointes を含む)、心室細動、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全、血小板減少、汎血球減少、溶血性貧血、白血球減少、無顆粒球症、中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群)、多形紅斑、PIE 症候群・間質性肺炎、偽膜性大腸炎、出血性大腸炎、横紋筋融解症、痙攣、急性腎障害、尿細管間質性腎炎、アレルギー性紫斑病、薬剤性過敏症症候群が報告されている。 (本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。)</p>

## II. 名称に関する項目


1. 販売名	
(1) 和名	クラリスロマイシン錠 200mg「杏林」
(2) 洋名	CLARITHROMYCIN Tablets 200mg “KYORIN”
(3) 名称の由来	成分の一般名に由来する。
2. 一般名	
(1) 和名（命名法）	クラリスロマイシン（JAN）
(2) 洋名（命名法）	Clarithromycin（JAN, INN）
(3) ステム	<i>Streptomyces</i> 属の産生する抗生物質：-mycin
3. 構造式又は示性式	
4. 分子式及び分子量	分子式：C <sub>38</sub> H <sub>69</sub> NO <sub>13</sub> 分子量：747.95
5. 化学名（命名法）	(2 <i>R</i> , 3 <i>S</i> , 4 <i>S</i> , 5 <i>R</i> , 6 <i>R</i> , 8 <i>R</i> , 10 <i>R</i> , 11 <i>R</i> , 12 <i>S</i> , 13 <i>R</i> )-5-(3, 4, 6-Trideoxy-3-dimethylamino-β-D-xylo-hexopyranosyloxy)-3-(2, 6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyloxy)-11, 12-dihydroxy-6-methoxy-2, 4, 6, 8, 10, 12-hexamethyl-9-oxopentadecan-13-olide (IUPAC)
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	略号：CAM
7. CAS 登録番号	81103-11-9

### Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質	
(1) 外観・性状	白色の結晶性の粉末で、味は苦い。
(2) 溶解性	アセトン又はクロロホルムにやや溶けやすく、メタノール、エタノール(95)又はジエチルエーテルに溶けにくく、水にほとんど溶けない。
(3) 吸湿性	該当資料なし
(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点	融点：220～227℃
(5) 酸塩基解離定数	該当資料なし
(6) 分配係数	該当資料なし
(7) その他の主な示性値	旋光度 $[\alpha]_D^{20}$ ：-87～-97° (脱水物に換算したもの 0.25g、クロロホルム、25mL、100mm)
2. 有効成分の各種条件下における安定性	該当資料なし
3. 有効成分の確認試験法	日本薬局方「クラリスロマイシン」の確認試験による。 (1) 呈色反応 (2) 呈色反応 (3) 赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法） (4) 薄層クロマトグラフィー
4. 有効成分の定量法	日本薬局方「クラリスロマイシン」の定量法による。 液体クロマトグラフィー



## IV. 製剤に関する項目

1. 剤形 (1) 剤形の区別、外観及び性状	剤形	フィルムコーティング錠
	色調	白色
	外観	
	直径 (mm)	9.1
	厚さ (mm)	5.2
	重量 (mg)	290
	(2) 製剤の物性	該当資料なし
(3) 識別コード	PH714	
(4) pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等	該当資料なし	
2. 製剤の組成		
(1) 有効成分（活性成分）の含量	1 錠中、日局クラリスロマイシン 200mg（力価）を含有	
(2) 添加物	トウモロコシデンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ポリソルベート 80、ステアリン酸カルシウム、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロース、酸化チタン	
(3) その他	特になし	
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	該当しない	

## IV. 製剤に関する項目

### 4. 製剤の各種条件下における安定性<sup>2)~4)</sup>

#### 【長期保存試験】<sup>2)</sup>

< 保存条件 >

25±2℃、60±5%RH

< 試験検体 >

PTP 包装品 : PTP 包装(ポリ塩化ビニルフィルム及びアルミニウム箔)、紙箱

< 試験項目及び規格 >

試験項目	規 格
性状	白色のフィルムコーティング錠である。
確認試験	赤外吸収スペクトル測定法の臭化カリウム錠剤法により測定するとき、波数 2980cm <sup>-1</sup> 、2940cm <sup>-1</sup> 、1734cm <sup>-1</sup> 、1693cm <sup>-1</sup> 、1459cm <sup>-1</sup> 、1379cm <sup>-1</sup> 及び 1171cm <sup>-1</sup> 付近に吸収を認める。
製剤均一性	含量均一性試験を行うとき、適合する。 (判定値 15.0%を超えない)
溶出性	日本薬局方医薬品各条クラリスロマイシン 200mg 錠の溶出規格に適合する。
定量(含量)	93.0~107.0% (力価)

< 試験結果 >

試験項目	開始時	1 年後	2 年後	3 年後
性状	適	適	適	適
確認試験	適	適	適	適
製剤均一性	適	適	適	適
溶出性	適	適	適	適
定量(含量)	101.1%	99.2%	99.7%	99.7%

(1 ロット n=3 の 3 ロットの平均値)

#### 【加速試験】<sup>3)</sup>

< 保存条件 >

40±1℃、75±5%RH

< 試験検体 >

PTP 包装品 : PTP 包装(ポリ塩化ビニルフィルム及びアルミニウム箔)、ポリ塩化ビニリデンコートポリプロピレンフィルムでピロー包装、紙箱

## IV. 製剤に関する項目

### < 試験項目及び規格 >

試験項目	規 格
性状	白色のフィルムコーティング錠である。
溶出性	日本薬局方外医薬品規格クラリスロマイシン 200mg(力価)錠溶出試験に適合する。
定量(含量)	93.0~107.0%(力価)

### < 試験結果 >

試験項目	開始時	1 ヶ月後	3 ヶ月後	6 ヶ月後
性状	適	適	適	適
溶出性	適	適	適	適
定量(含量)	98.5%	99.5%	99.7%	98.5%

(1ロット n=3 の 3ロットの平均値)

### 【無包装状態における安定性】<sup>4)</sup>

条 件	結 果*
温度 (40℃、3 ヶ月(気密容器))	性 状：変化なし 硬 度：変化なし 溶出性：変化なし 含 量：変化なし
湿度 (75%RH、30℃、3 ヶ月 (シャーレ・開放))	性 状：変化なし 硬 度：変化なし 溶出性：変化なし 含 量：変化なし
光 (曝光量 120 万 lx・hr (気密容器))	性 状：変化なし 硬 度：変化なし 溶出性：変化なし 含 量：変化なし

\* 「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)平成 11 年 8 月 20 日」の評価基準による。

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化  
(物理化学的变化)

該当しない

7. 溶出性<sup>5)</sup>

### 【溶出挙動における類似性】

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(医薬審第 487 号平成 9 年 12 月 22 日)に従い、標準製剤との溶出挙動の比較を行った。

### < 試験方法 >

試 験 法：日本薬局方 一般試験法 溶出試験法第 2 法(パドル法)

試 験 液：900mL

試験液の温度：37±0.5℃

## IV. 製剤に関する項目

試験液		回転数
pH1.2	日本薬局方 崩壊試験の第1液	50 回転/分
pH3.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	50 回転/分
pH6.8	日本薬局方 崩壊試験の第2液	50 回転/分
水	日本薬局方 精製水	50 回転/分
pH3.0	薄めた McIlvaine の緩衝液	100 回転/分

### <判定基準>

○標準製剤の溶出に明確なラグ時間がなく、標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合：試験製剤は 15 分以内に平均 85%以上溶出する。又は、15 分において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。

(pH3.0/100rpm)

○標準製剤の溶出に明確なラグ時間がなく標準製剤が 30 分以降に平均 85%以上溶出する場合：標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の適当な 2 時点において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。

(pH3.0/50rpm、pH6.8/50rpm)

○標準製剤の平均溶出率が規定された試験時間以内に 85%に達しない場合：標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±a%の範囲にある。a は、溶出率が 50%以上の場合には 15、50%未満の場合には 8 とする。

(pH1.2/50rpm、水/50rpm)






### <結 果>

溶出条件	測定点 (分)	12 ベッセルの平均溶出率(%)		平均 溶出率 の差(%)
		クラリスロマイシン 錠 200mg「杏林」	標準製剤 (錠剤、200mg)	
pH1.2/50rpm	60	36.0	28.5	+7.5
	120	60.5	53.3	+7.2
pH3.0/50rpm	10	23.1	37.2	-14.1
	120	96.1	85.7	+10.1
pH6.8/50rpm	10	27.5	42.2	-14.7
	60	74.9	85.0	-10.1
水/50rpm	60	11.6	12.4	-0.8
	360	26.5	25.4	+1.1
pH3.0/100rpm	15	97.5	97.6	-0.1

## IV. 製剤に関する項目

pH3.0/100rpmにおいて15分以内に平均85%以上溶出した。pH3.0及びpH6.8において標準製剤の平均溶出率が40%及び85%付近の適当な2時点において、クラリスロマイシン錠200mg「杏林」の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率 $\pm 15\%$ の範囲にあった。pH1.2及び水において標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率 $\pm a\%$ の範囲にあった(aはpH1.2の120分が $\pm 15\%$ で、それ以外は $\pm 8\%$ )。

以上の結果より、クラリスロマイシン錠200mg「杏林」は標準製剤と同等であると判定された。



## IV. 製剤に関する項目

	<p><b>【公的溶出規格への適合性】</b></p> <p>クラリスロマイシン錠 200mg「杏林」は、日本薬局方医薬品各条に定められたクラリスロマイシン錠の溶出規格に適合していることが確認されている。</p> <p>試験条件：pH6.0 の 0.05mol/L リン酸水素二ナトリウム・クエン酸緩衝液 900mL、パドル法、毎分 50 回転</p> <p>溶出規格：30 分間 75%以上</p> <p>30 分間の溶出率（3 ロットの最小値～最大値）：90.7%～102.9%</p>
8. 生物学的試験法	該当しない
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	日本薬局方「クラリスロマイシン錠」の確認試験による。 赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法）
10. 製剤中の有効成分の定量法	日本薬局方「クラリスロマイシン錠」の定量法による。 液体クロマトグラフィー
11. 力価	クラリスロマイシン(C <sub>38</sub> F <sub>69</sub> N <sub>13</sub> )としての量を重量(力価)で示す。
12. 混入する可能性のある夾雑物	該当資料なし
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	特になし
14. その他	特になし

## V. 治療に関する項目

### 1. 効能又は効果

#### 1. 一般感染症

##### <適応菌種>

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、インフルエンザ菌、レジオネラ属、カンピロバクター属、ペプトストレプトコッカス属、クラミジア属、マイコプラズマ属

##### <適応症>

- 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症
- 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染
- 肛門周囲膿瘍
- 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染
- 尿道炎
- 子宮頸管炎
- 感染性腸炎
- 中耳炎、副鼻腔炎
- 歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎

#### 2. 非結核性抗酸菌症

##### <適応菌種>

本剤に感性のマイコバクテリウム属

##### <適応症>

マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）症を含む非結核性抗酸菌症

#### 3. ヘリコバクター・ピロリ感染症

##### <適応菌種>

本剤に感性のヘリコバクター・ピロリ

##### <適応症>

胃潰瘍・十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎

#### <効能・効果に関連する使用上の注意>

1. 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、感染性腸炎、副鼻腔炎への使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」<sup>6)</sup>を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。
2. 進行期胃 MALT リンパ腫に対するヘリコバクター・ピロリ除菌治療の有

## V. 治療に関する項目

### 2. 用法及び用量

効性は確立していない。

3. 特発性血小板減少性紫斑病に対しては、ガイドライン等を参照し、ヘリコバクター・ピロリ除菌治療が適切と判断される症例にのみ除菌治療を行うこと。
4. 早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃以外には、ヘリコバクター・ピロリ除菌治療による胃癌の発症抑制に対する有効性は確立していない。
5. ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に用いる際には、ヘリコバクター・ピロリが陽性であること及び内視鏡検査によりヘリコバクター・ピロリ感染胃炎であることを確認すること。

#### 1. 一般感染症

通常、成人にはクラリスロマイシンとして1日400mg（力価）を2回に分けて経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

#### 2. 非結核性抗酸菌症

通常、成人にはクラリスロマイシンとして1日800mg（力価）を2回に分けて経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

#### 3. ヘリコバクター・ピロリ感染症

通常、成人にはクラリスロマイシンとして1回200mg（力価）、アモキシシリン水和物として1回750mg（力価）及びプロトンポンプインヒビターの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。

なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。ただし、1回400mg（力価）1日2回を上限とする。

#### <用法・用量に関連する使用上の注意>

1. 本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。
2. 非結核性抗酸菌症の肺マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）症及び後天性免疫不全症候群（エイズ）に伴う播種性MAC症の治療に用いる場合、国内外の最新のガイドライン等を参考に併用療法を行うこと<sup>註1)</sup>。
3. 非結核性抗酸菌症に対する本剤の投与期間は、以下を参照すること。



## V. 治療に関する項目

疾患名	投与期間
肺MAC症	排菌陰性を確認した後、1年以上の投与継続と定期的な検査を行うことが望ましい。また、再発する可能性があるため治療終了後においても定期的な検査が必要である。
後天性免疫不全症候群（エイズ）に伴う播種性MAC症	臨床的又は細菌学的な改善が認められた後も継続投与すべきである。

3. 臨床成績	
(1) 臨床データパッケージ	該当資料なし
(2) 臨床効果	該当資料なし
(3) 臨床薬理試験	該当資料なし
(4) 探索的試験	該当資料なし
(5) 検証的試験	
1) 無作為化並行用量反応試験	該当資料なし

## V. 治療に関する項目

---

2) 比較試験	該当資料なし
3) 安全性試験	該当資料なし
4) 患者・病態別試験	該当資料なし
(6) 治療的使用	
1) 使用成績調査・特定 使用成績調査（特別 調査）・製造販売後 臨床試験（市販後臨 床試験）	該当資料なし
2) 承認条件として実 施予定の内容又は 実施した試験の概 要	該当しない

---

## VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	マクロライド系抗生物質（エリスロマイシンエチルコハク酸エステル、ロキシシスロマイシン、アジスロマイシン水和物、ジョサマイシン他）
2. 薬理作用	
(1) 作用部位・作用機序 <sup>1)</sup>	細菌の 70S リボソームの 50S サブユニットと結合し、タンパク合成を阻害することにより、抗菌作用を発揮する。
(2) 薬効を裏付ける試験成績	該当資料なし
(3) 作用発現時間・持続時間	該当資料なし

## VII. 薬物動態に関する項目

### 1. 血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 最高血中濃度到達時間

VII. 薬物動態に関する項目、1. 血中濃度の推移・測定法(3)臨床試験で確認された血中濃度の項を参照

(3) 臨床試験で確認された血中濃度<sup>7)</sup>


#### 【生物学的同等性試験】

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(医薬審第487号平成9年12月22日)に従い、健康成人男子を対象に生物学的同等性試験を実施した。

クラリスロマイシン錠 200mg「杏林」と標準製剤をクロスオーバー法によりそれぞれ1錠(クラリスロマイシンとして200mg(力価))健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、C<sub>max</sub>)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)~log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0→24</sub> (ng・hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
クラリスロマイシン 錠 200mg「杏林」	3804.6 ±1167.7	602.6 ±162.9	2.54 ±1.16	3.38 ±2.09
標準製剤 (錠剤、200mg)	3586.6 ±745.8	560.0 ±116.2	2.08 ±0.70	3.09 ±1.67

(Mean ± S. D., n=12)



血漿中濃度並びに AUC、C<sub>max</sub> 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

## VII. 薬物動態に関する項目

(4) 中毒域	該当資料なし
(5) 食事・併用薬の影響	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、7. 相互作用の項及び 14. 適用上の注意(2)の項を参照
(6) 母集団(ポピュレーション)解析により判明した薬物体内動態変動要因	該当資料なし
2. 薬物速度論的パラメータ	
(1) 解析方法	該当資料なし
(2) 吸収速度定数	該当資料なし
(3) バイオアベイラビリティ	該当資料なし
(4) 消失速度定数	0.2597±0.1135 (hr <sup>-1</sup> ) (n=12)
(5) クリアランス	該当資料なし
(6) 分布容積	該当資料なし
(7) 血漿蛋白結合率 <sup>1)</sup>	ヒト血清タンパク結合率: 42~50%
3. 吸収	該当資料なし
4. 分布	
(1) 血液-脳関門通過性	該当資料なし
(2) 血液-胎盤関門通過性	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与(1)の項を参照
(3) 乳汁への移行性	VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与(2)の項を参照

## VII. 薬物動態に関する項目

(4) 髄液への移行性	該当資料なし
(5) その他の組織への移行性 <sup>1)</sup>	健康成人で唾液、患者で喀痰、気管支分泌物などへの移行は良好で、血清中濃度と同等又はそれ以上であり、特に皮膚、扁桃、上顎洞粘膜などの組織中濃度はほとんどの例で血清中濃度を大きく上回った。
5. 代謝	
(1) 代謝部位及び代謝経路 <sup>1)</sup>	ヒトでの主代謝物は 14 位水酸化体であり、血清中には未変化体とほぼ同量が存在した。
(2) 代謝に関与する酵素 (CYP450 等) の分子種	CYP3A4 によって代謝される。
(3) 初回通過効果の有無及びその割合	該当資料なし
(4) 代謝物の活性の有無及び比率 <sup>1)</sup>	ヒトの主代謝物である 14 位水酸化体は、ブドウ球菌属などに対して未変化体とほぼ同等の抗菌力を有するが、 <i>Mycobacterium avium complex</i> に対しては未変化体よりも弱い。
(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ	該当資料なし
6. 排泄	
(1) 排泄部位及び経路	該当資料なし
(2) 排泄率 <sup>1)</sup>	尿中には、投与後 24 時間までに、30~50%が主として未変化体及び 14 位水酸化体として排泄された。
(3) 排泄速度	該当資料なし
7. トランスポーターに関する情報	該当資料なし
8. 透析等による除去率	該当資料なし

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由	該当しない
2. 禁忌内容とその理由 (原則禁忌を含む)	<p><b>【禁忌（次の患者には投与しないこと）】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本剤に対して過敏症の既往歴のある患者</li> <li>2. ピモジド、エルゴタミン含有製剤、スポレキサント、ロミタピドメシル酸塩、タダラフィル〔アドシルカ〕、チカグレロル、イブルチニブ、アスナプレビル、バニプレビルを投与中の患者（「相互作用」の項参照）</li> <li>3. 肝臓又は腎臓に障害のある患者で、コルヒチンを投与中の患者（「相互作用」の項参照）</li> </ol>
3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	V. 治療に関する項目、1. 効能又は効果<効能・効果に関連する使用上の注意>の項を参照
4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	V. 治療に関する項目、2. 用法及び用量<用法・用量に関連する使用上の注意>の項を参照
5. 慎重投与内容とその理由	<p><b>慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 他のマクロライド系薬剤に対して過敏症の既往歴のある患者</li> <li>(2) 肝機能障害のある患者〔肝機能障害を悪化させることがある（「副作用」の項参照）〕</li> <li>(3) 腎機能障害のある患者〔血中濃度が上昇するおそれがある（「相互作用」の項参照）〕</li> <li>(4) 心疾患のある患者、低カリウム血症のある患者〔QT 延長、心室頻拍（Torsades de pointes を含む）、心室細動をおこすことがある（「副作用」の項参照）〕</li> <li>(5) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）</li> </ol>
6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	<p><b>重要な基本的注意</b></p> <p>本剤をヘリコバクター・ピロリ感染症に用いる際には、除菌治療に用いられる他の薬剤の添付文書に記載されている禁忌、慎重投与、重大な副作用等の使用上の注意を必ず確認すること。</p>

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

### 7. 相互作用

本剤は、肝代謝酵素チトクローム P450 (CYP) 3A4 阻害作用を有することから、CYP3A4 で代謝される薬剤と併用したとき、併用薬剤の代謝が阻害され血中濃度が上昇する可能性がある。また、本剤は、P-糖蛋白質に対する阻害作用を有することから、P-糖蛋白質を介して排出される薬剤と併用したとき、併用薬剤の排出が阻害され血中濃度が上昇する可能性がある。一方、本剤は CYP3A4 によって代謝されることから、CYP3A4 を阻害する薬剤と併用したとき、本剤の代謝が阻害され未変化体の血中濃度が上昇する可能性があり、また、CYP3A4 を誘導する薬剤と併用したとき、本剤の代謝が促進され未変化体の血中濃度が低下する可能性がある。

#### (1) 併用禁忌とその理由

##### 【併用禁忌】（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ピモジド 〔オーラップ〕	QT 延長、心室性不整脈（Torsades de pointes を含む）等の心血管系副作用が報告されている。	本剤の CYP3A4 に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。
エルゴタミン(エルゴタミン酒石酸塩、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩) 含有製剤 〔クリアミン〕 〔ジヒデルゴット〕	血管攣縮等の重篤な副作用をおこすおそれがある。	
スボレキサント 〔ベルソムラ〕	スボレキサントの血漿中濃度が顕著に上昇し、その作用が著しく増強するおそれがある。	
ロミタピドメシル酸塩 〔ジャクスタピッド〕	ロミタピドメシル酸塩の血中濃度が著しく上昇するおそれがある。	
タダラフィル 〔アドシルカ〕	左記薬剤のクリアランスが高度に減少し、その作用が増強するおそれがある。	
チカグレロル 〔ブリリント〕	チカグレロルの血漿中濃度が著しく上昇するおそれがある。	
イブルチニブ 〔イムブルビカ〕	イブルチニブの血中濃度が上昇し、その作用が増強するおそれがある。	



## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

アスナプレビル 〔スンベプラ〕 〔ジメンシー〕	アスナプレビルの血中濃度が上昇し、肝臓に関連した副作用が発現、重症化するおそれがある。	
バニプレビル 〔バニヘップ〕	バニプレビルの血中濃度が上昇し、悪心、嘔吐、下痢の発現が増加するおそれがある。	

### (2) 併用注意とその理由

【併用注意】（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジゴキシン	嘔気、嘔吐、不整脈等が報告されているので、ジゴキシンの血中濃度の推移、自覚症状、心電図等に注意し、異常が認められた場合には、投与量を調節する等の適切な処置を行うこと。	本剤の腸内細菌叢に対する影響により、ジゴキシンの不活化が抑制されるか、もしくはP-糖蛋白質を介したジゴキシンの輸送が阻害されることにより、その血中濃度が上昇する。
スルホニル尿素系血糖降下剤 グリベンクラミド等	低血糖（意識障害に至ることがある）が報告されているので、異常が認められた場合には、投与を中止し、ブドウ糖の投与等の適切な処置を行うこと。	機序は明確ではないが、本剤との併用により、左記薬剤の血中濃度が上昇する可能性がある。
カルバマゼピン テオフィリン アミノフィリン水和物 シクロスポリン タクロリムス水和物 エベロリムス	左記薬剤の血中濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性があるため、左記薬剤の血中濃度の推移等に注意し、異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害される。
アトルバスタチンカルシウム水和物 シンバスタチン	左記薬剤の血中濃度上昇に伴う横紋筋融解症が報告されているので、異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等	

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

ロバスタチン (国内未承認)	の適切な処置を行うこと。 腎機能障害のある患者には特に注意すること。
コルヒチン	コルヒチンの血中濃度上昇に伴う中毒症状（汎血球減少、肝機能障害、筋肉痛、腹痛、嘔吐、下痢、発熱等）が報告されているので、異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。 なお、肝臓又は腎臓に障害のある患者で、コルヒチンを投与中の患者には、本剤を併用しないこと。
ベンゾジアゼピン系薬剤 (CYP3A4 で代謝される薬剤) トリアゾラム ミダゾラム等 非定型抗精神病薬 (CYP3A4 で代謝される薬剤) クエチアピンプ マル酸塩等 ジソピラミド エプレレノン エレトリプタン臭化水素酸塩 カルシウム拮抗剤 (CYP3A4 で代謝される薬剤) ニフェジピン ベラパミル塩酸塩等 ジエノゲスト ホスホジエステラー	左記薬剤の血中濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性がある ので、異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

<p>ゼ 5 阻害剤 シルデナフィルク エン酸塩 タダラフィル 〔シアリス、ザルテ ィア〕等 クマリン系抗凝血剤 ワルファリンカリ ウム等 ドセタキセル水和物 オキシコドン塩酸塩 水和物 フェンタニル／フェ ンタニルクエン酸塩</p>		
<p>抗凝固剤 (CYP3A4 で代謝さ れ、P-糖蛋白質で 排出される薬剤) アピキサバン リバーロキサバ ン  (P-糖蛋白質で排 出される薬剤) ダビガトランエ テキシラート エドキサバント シル酸塩水和物</p>	<p>左記薬剤の血中濃度上昇に伴 う作用の増強等の可能性があ るので、異常が認められた場合 には、投与量の調節や中止等の 適切な処置を行うこと。</p>	<p>本剤の CYP3A4 及び P-糖蛋白質に対する 阻害作用により、左 記薬剤の代謝及び排 出が阻害される。  本剤の P-糖蛋白質に 対する阻害作用によ り、左記薬剤の排出 が阻害される。</p>
<p>イトラコナゾール HIV プロテアーゼ阻 害剤 サキナビルメシル 酸塩 リトナビル等</p>	<p>本剤の未変化体の血中濃度上 昇による作用の増強等の可能 性がある。 また、イトラコナゾール、サキ ナビルメシル酸塩の併用にお いては、これら薬剤の血中濃度 上昇に伴う作用の増強等の可 能性がある。 異常が認められた場合には、投</p>	<p>本剤と左記薬剤の CYP3A4 に対する阻害 作用により、相互に 代謝が阻害される。</p>

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

	与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。	
リファブチン エトラピリン	左記薬剤の血中濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性がある。 また、本剤の未変化体の血中濃度が低下し、活性代謝物の血中濃度が上昇し、本剤の作用が減弱する可能性がある。 異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害される。 また、左記薬剤のCYP3A4に対する誘導作用により、本剤の代謝が促進される。
リファンピシン エファビレンツ ネビラピン	本剤の未変化体の血中濃度が低下し、活性代謝物の血中濃度が上昇する可能性がある。本剤の作用が減弱する可能性がある。 ので、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。	左記薬剤のCYP3A4に対する誘導作用により、本剤の代謝が促進される。

### 8. 副作用

#### (1) 副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

#### (2) 重大な副作用と初期症状

##### 重大な副作用

- 1) ショック、アナフィラキシー（頻度不明）：ショック、アナフィラキシー（呼吸困難、痙攣、発赤等）をおこすことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) QT 延長、心室頻拍（Torsades de pointes を含む）、心室細動（頻度不明）：QT 延長、心室頻拍（Torsades de pointes を含む）、心室細動があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、QT 延長等の心疾患のある患者、低カリウム血症のある患者においては特に注意すること（「慎重投与」の項参照）。
- 3) 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全（頻度不明）：劇症肝炎、AST (GOT)、ALT (GPT)、 $\gamma$ -GTP、LDH、Al-P の上昇等を伴う肝機能障害、黄疸、肝不

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

全があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

- 4) **血小板減少、汎血球減少、溶血性貧血、白血球減少、無顆粒球症**（頻度不明）：血小板減少、汎血球減少、溶血性貧血、白血球減少、無顆粒球症があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 5) **中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、多形紅斑**（頻度不明）：中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 6) **PIE 症候群・間質性肺炎**（頻度不明）：発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部 X 線異常、好酸球増多等を伴う PIE 症候群・間質性肺炎があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 7) **偽膜性大腸炎、出血性大腸炎**（頻度不明）：偽膜性大腸炎、出血性大腸炎等の重篤な大腸炎があらわれることがあるので、腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 8) **横紋筋融解症**（頻度不明）：筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うとともに、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。
- 9) **痙攣**（頻度不明）：痙攣（強直間代性、ミオクロヌス、意識消失発作等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 10) **急性腎障害、尿細管間質性腎炎**（頻度不明）：急性腎障害、尿細管間質性腎炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、乏尿等の症状や血中クレアチニン値上昇等の腎機能低下所見が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 11) **アレルギー性紫斑病**（頻度不明）：アレルギー性紫斑病があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 12) **薬剤性過敏症症候群<sup>註 2)</sup>**（頻度不明）：初期症状として発疹、発熱がみられ、さらに肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれること

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

### (3) その他の副作用

があるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。

#### その他の副作用

下記のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて、適切な処置を行うこと。

分類	副作用（頻度不明）
過敏症	発疹 <sup>注1)</sup> 、う痒感
精神神経系	めまい、頭痛、不眠、幻覚 <sup>注1)</sup> 、失見当識 <sup>注1)</sup> 、意識障害 <sup>注1)</sup> 、せん妄 <sup>注1)</sup> 、躁病 <sup>注1)</sup> 、眠気、振戦 <sup>注1)</sup> 、しびれ（感） <sup>注1)</sup> 、錯感覚
感覚器	味覚異常（にがみ等）、耳鳴 <sup>注1)</sup> 、聴力低下 <sup>注1)</sup> 、嗅覚異常 <sup>注1)</sup>
消化器	悪心、嘔吐、胃部不快感、腹部膨満感、腹痛、下痢、食欲不振、軟便、口内炎、舌炎、舌変色、口腔内びらん <sup>注1)</sup> 、胸やけ、口渇、歯牙変色 <sup>注1)</sup>
血液	好酸球増多
肝臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、 $\gamma$ -GTP 上昇、LDH 上昇、Al-P 上昇
筋・骨格	筋肉痛 <sup>注1)</sup>
その他	う怠感、浮腫、カンジダ症 <sup>注1)</sup> 、動悸 <sup>注1)</sup> 、発熱、CK(CPK) 上昇 <sup>注1)</sup> 、脱毛、頻尿、低血糖 <sup>注1)</sup>

注1) あらわれた場合には投与を中止すること。

後天性免疫不全症候群（エイズ）に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症を対象とした試験で認められた副作用

分類	副作用（頻度不明）
精神神経系	不眠症、頭痛、めまい、激越、神経過敏症、感覚異常、痙攣、妄想、幻覚、運動過多、躁病反応、偏執反応、末梢神経炎、精神病
感覚器	味覚減退、味覚倒錯、難聴、耳鳴、味覚喪失、結膜炎
皮膚	発疹、う痒感、斑状丘疹状皮疹、あ瘡、帯状疱疹、紫斑皮疹、光線過敏性反応、発汗
消化器	下痢、悪心、食欲不振、腹痛、嘔吐、逆流性食道炎、鼓腸放屁、消化不良、便秘、おくび、口渇、舌炎、舌変色

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

血液	白血球減少、貧血、再生不良性貧血、好中球減少、骨髄機能不全
肝臓	肝機能異常、 $\gamma$ -GTP 上昇、A1-P 上昇、AST (GOT) 上昇、ALT (GPT) 上昇、胆汁うっ滞性黄疸、肝炎、ビリルビン上昇
腎臓	急性腎障害、BUN 上昇、クレアチニン上昇
生殖器	子宮頸部上皮異形成、膣カンジダ症
筋・骨格	筋肉痛、関節痛
その他	高脂血症、トリグリセリド上昇、高尿酸血症、低カリウム血症、徐脈、無力症、アミラーゼ上昇、カンジダ症、疼痛、しゃっくり、発熱、胸痛、さむけ、酵素上昇

ヘリコバクター・ピロリ感染症に対する除菌療法（3剤併用）で認められた副作用

分類	副作用（頻度不明）
過敏症 <sup>注2)</sup>	発疹、う痒
精神神経系	頭痛、しびれ感、めまい、眠気、不眠、うつ状態
消化器	下痢、軟便、味覚異常、腹痛、腹部膨満感、口内炎、便秘、食道炎、口渇、悪心、舌炎、胃食道逆流、胸やけ、十二指腸炎、嘔吐、痔核、食欲不振
血液 <sup>注3)</sup>	好中球減少、好酸球増多、貧血、白血球増多、血小板減少
肝臓 <sup>注3)</sup>	AST (GOT) 上昇、ALT (GPT) 上昇、LDH 上昇、 $\gamma$ -GTP 上昇、A1-P 上昇、ビリルビン上昇
その他	尿蛋白陽性、トリグリセリド上昇、総コレステロール上昇・減少、尿糖陽性、尿酸上昇、う怠感、熱感、動悸、発熱、QT 延長、カンジダ症、浮腫、血圧上昇、霧視

注2) このような場合には投与を中止すること。

注3) 観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。

(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当資料なし

(5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当資料なし

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

### (6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法

- (1) 禁忌（次の患者には投与しないこと）  
本剤に対して過敏症の既往歴のある患者
- (2) 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）  
他のマクロライド系薬剤に対して過敏症の既往歴のある患者
- (3) 重大な副作用
  - 1) ショック、アナフィラキシー（頻度不明）：ショック、アナフィラキシー（呼吸困難、痙攣、発赤等）を起こすことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
  - 2) アレルギー性紫斑病（頻度不明）：アレルギー性紫斑病があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
  - 3) 薬剤性過敏症症候群（頻度不明）：初期症状として発疹、発熱がみられ、さらに肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。
- (4) その他の副作用  
下記のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。  
過敏症：発疹<sup>注1</sup>、痒痒感  
注1) あらわれた場合には投与を中止すること。
- 4) ヘリコバクター・ピロリ感染症に対する除菌療法（3剤併用）で認められた副作用  
過敏症<sup>注2</sup>：発疹、痒痒  
注2) このような場合には投与を中止すること。

### 9. 高齢者への投与

一般に高齢者では、生理機能が低下しており、高い血中濃度が持続するおそれがあるので、慎重に投与すること。

### 10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 動物実験で、母動物に毒性があらわれる高用量において、胎児毒性（心血管系の異常、口蓋裂、発育遅延等）が報告されているので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。  
なお、国外における試験で次のような報告がある。SD系ラット（15



## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

	<p>～150mg/kg/日）及び CD-1 系マウス（15～1,000mg/kg/日）において、それぞれ母動物に毒性があらわれる最高用量でラット胎児に心血管系異常並びにマウス胎児に口蓋裂が認められた。また、サル（35～70mg/kg/日）において、母動物に毒性があらわれる 70mg/kg/日で 9 例中 1 例に低体重の胎児がみられたが、外表、内臓、骨格には異常は認められなかった。</p> <p>また、ラットにクラリスロマイシン（160mg/kg/日）、ランソプラゾール（50mg/kg/日）及びアモキシシリン水和物（500mg/kg/日）を併用投与した試験において、母動物での毒性の増強とともに胎児の発育抑制の増強が認められている。</p> <p>さらに、ラットにクラリスロマイシン（50mg/kg/日以上）、ラベプラゾールナトリウム（25mg/kg/日）及びアモキシシリン水和物（400mg/kg/日以上）を 4 週間併用投与した試験で、雌で栄養状態の悪化が認められている。</p> <p>(2) ヒト母乳中へ移行することが報告されているので、授乳中の婦人には、本剤投与中は授乳を避けさせること。</p> <p>なお、動物実験（ラット）の乳汁中濃度は、血中濃度の約 2.5 倍で推移した。</p>
11. 小児等への投与	<p>低出生体重児および新生児に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。</p>
12. 臨床検査結果に及ぼす影響	<p>該当資料なし</p>
13. 過量投与	<p>該当資料なし</p>
14. 適用上の注意	<p>(1) レジオネラ肺炎の治療において単独で使用する事が望ましいが、患者の症状に応じて併用が必要な場合には以下の報告を参考に併用する薬剤の特徴を考慮し選択すること。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 中等症以上の患者にリファンピシンと併用し有効との報告がある。</li> <li>2) <i>in vitro</i> 抗菌力の検討において、本剤とレボフロキサシンまたはシプロフロキサシンとの併用効果（相乗ないし相加作用）が認められたとの報告がある。</li> </ol> <p>(2) 投与時：健常人での薬物動態試験で天然ケイ酸アルミニウムと併用した場合、本剤の吸収が低下するとの報告がある。</p> <p>(3) 薬剤交付時：PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう</p>

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

	<p>指導すること。[PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]</p>
15. その他の注意	<p>(1) ラットにアモキシシリン水和物 (2,000mg/kg/日) とランソプラゾール (15mg/kg/日以上) の 4 週間併用経口投与した試験、及びイヌにアモキシシリン水和物 (500mg/kg/日)、ランソプラゾール (100mg/kg/日)、クラリスロマイシン (25mg/kg/日) の 4 週間併用経口投与した試験で、アモキシシリン水和物を単独あるいは併用投与した動物に結晶尿が認められているが、結晶はアモキシシリン水和物が排尿後に析出したものであり、体内で析出したものではないことが確認されている。</p> <p>(2) <b>ヘリコバクター・ピロリの除菌判定上の注意</b>：ランソプラゾール等のプロトンポンプインヒビターやアモキシシリン水和物、クラリスロマイシン等の抗生物質の服用中や投与終了直後では、<sup>13</sup>C-尿素呼気試験の判定結果が偽陰性になる可能性があるため、<sup>13</sup>C-尿素呼気試験による除菌判定を行う場合には、これらの薬剤の投与終了後 4 週以降の時点で実施することが望ましい。</p>
16. その他	特になし

## Ⅸ. 非臨床試験に関する項目

---

1. 薬理試験	
(1) 薬効薬理試験（「Ⅵ. 薬効薬理に関する項目」参照）	
(2) 副次的薬理試験	該当資料なし
(3) 安全性薬理試験	該当資料なし
(4) その他の薬理試験	該当資料なし
2. 毒性試験	
(1) 単回投与毒性試験	該当資料なし
(2) 反復投与毒性試験	該当資料なし
(3) 生殖発生毒性試験	該当資料なし
(4) その他の特殊毒性	該当資料なし

---

## X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分	製 剤：クラリスロマイシン錠 200mg「杏林」 処方箋医薬品 <sup>注)</sup> 有効成分：クラリスロマイシン 処方箋医薬品 <sup>注)</sup> 注) 注意－医師等の処方箋により使用すること
2. 有効期間又は使用期限	使用期限：3年（安定性試験結果に基づく <sup>2)、3)</sup> )
3. 貯法・保存条件	室温保存
4. 薬剤取扱い上の注意点	(1) 薬局での取り扱い上の留意点について 特になし  (2) 薬剤交付時の取り扱いについて(患者等に留意すべき必須事項等) VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目、14. 適用上の注意(3)の項を参照 くすりのしおり：有り  (3) 調剤時の留意点について 特になし
5. 承認条件等	該当しない
6. 包装	PTP：100錠、500錠
7. 容器の材質	[PTP 包装品] PTP 包装：ポリ塩化ビニルフィルム、アルミニウム箔 紙箱
8. 同一成分・同効薬	同一成分薬：クラリス錠 200、クラリシッド錠 200mg、クラリスロマイシン錠 50mg 小児用「杏林」、クラリス錠 50、クラリシッド錠 50mg 同 効 薬：マクロライド系抗生物質（エリスロマイシンエチルコハク酸エ ステル、ロキシスロマイシン、アジスロマイシン水和物、ジョ サマイシン他)
9. 国際誕生年月日	1989年7月17日

## X. 管理的事項に関する項目

10. 製造販売承認年月日 及び承認番号	<p>製造販売承認年月日：2012年 2月 23日 承認番号：22400AMX00626000 (旧販売名) クラリスロマイシン錠 200mg「PH」 製造販売承認年月日：2006年 3月 15日</p>				
11. 薬価基準収載年月日	<p>2012年 12月 14日 (旧販売名) クラリスロマイシン錠 200mg「PH」 薬価基準収載年月日：2006年 7月 7日 経過措置期間満了：2013年 9月 30日</p>				
12. 効能又は効果追加、 用法及び用量変更追 加等の年月日及びそ の内容	<p>○一部変更承認年月日：2007年 3月 23日 内容：ヘリコバクター・ピロリ感染症における「クラリスロマイシン、アモキシシリン水和物及びオメプラゾール併用の場合」の用法・用量の追加。</p> <p>○一部変更承認年月日：2009年 12月 3日 内容：「非結核性抗酸菌症」の効能・効果の追加及びそれに関連する用法・用量の追加。</p> <p>○一部変更承認年月日：2010年 11月 15日 内容：「胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症」の効能・効果の追加及びそれに関連する用法・用量の追加。</p> <p>○一部変更承認年月日：2011年 7月 25日 内容：ヘリコバクター・ピロリ感染症における用法・用量の変更</p>				
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="483 1355 962 1393">変更後</th> <th data-bbox="962 1355 1434 1393">変更前</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 1393 962 2083"> <p><b>【用法・用量】</b> 3. ヘリコバクター・ピロリ感染症 通常、成人にはクラリスロマイシンとして1回 200mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回 750mg(力価)及びプロトンポンプインヒビターの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。 なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。ただし、1回 400mg(力価)1日2回を上限とする。</p> </td> <td data-bbox="962 1393 1434 2083"> <p><b>【用法・用量】</b> 3. ヘリコバクター・ピロリ感染症 ○クラリスロマイシン、アモキシシリン水和物及びランソプラゾール併用の場合 通常、成人にはクラリスロマイシンとして1回 200 mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回 750 mg(力価)及びランソプラゾールとして1回 30 mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。 なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。 ただし、1回 400 mg(力価)1日2回を上限とする。 ○クラリスロマイシン、アモキシシリン水和物及びオメプラゾール併用の場合 通常、成人にはクラリスロマイシンと</p> </td> </tr> </tbody> </table>		変更後	変更前	<p><b>【用法・用量】</b> 3. ヘリコバクター・ピロリ感染症 通常、成人にはクラリスロマイシンとして1回 200mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回 750mg(力価)及びプロトンポンプインヒビターの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。 なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。ただし、1回 400mg(力価)1日2回を上限とする。</p>	<p><b>【用法・用量】</b> 3. ヘリコバクター・ピロリ感染症 ○クラリスロマイシン、アモキシシリン水和物及びランソプラゾール併用の場合 通常、成人にはクラリスロマイシンとして1回 200 mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回 750 mg(力価)及びランソプラゾールとして1回 30 mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。 なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。 ただし、1回 400 mg(力価)1日2回を上限とする。 ○クラリスロマイシン、アモキシシリン水和物及びオメプラゾール併用の場合 通常、成人にはクラリスロマイシンと</p>
変更後	変更前				
<p><b>【用法・用量】</b> 3. ヘリコバクター・ピロリ感染症 通常、成人にはクラリスロマイシンとして1回 200mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回 750mg(力価)及びプロトンポンプインヒビターの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。 なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。ただし、1回 400mg(力価)1日2回を上限とする。</p>	<p><b>【用法・用量】</b> 3. ヘリコバクター・ピロリ感染症 ○クラリスロマイシン、アモキシシリン水和物及びランソプラゾール併用の場合 通常、成人にはクラリスロマイシンとして1回 200 mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回 750 mg(力価)及びランソプラゾールとして1回 30 mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。 なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。 ただし、1回 400 mg(力価)1日2回を上限とする。 ○クラリスロマイシン、アモキシシリン水和物及びオメプラゾール併用の場合 通常、成人にはクラリスロマイシンと</p>				

## X. 管理的事項に関する項目

	<table border="1" data-bbox="485 259 1436 573"> <tr> <td data-bbox="485 259 959 573"></td> <td data-bbox="959 259 1436 573"> <p>して1回200mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回750mg(力価)及びオメプラゾールとして1回20mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。ただし、1回400mg(力価)1日2回を上限とする。</p> </td> </tr> </table> <p>○一部変更承認年月日：2013年7月4日 内容：「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」の効能。効果の追加</p>		<p>して1回200mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回750mg(力価)及びオメプラゾールとして1回20mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。ただし、1回400mg(力価)1日2回を上限とする。</p>				
	<p>して1回200mg(力価)、アモキシシリン水和物として1回750mg(力価)及びオメプラゾールとして1回20mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。ただし、1回400mg(力価)1日2回を上限とする。</p>						
<p>13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容</p>	<p>該当しない</p>						
<p>14. 再審査期間</p>	<p>該当しない</p>						
<p>15. 投薬期間制限医薬品に関する情報</p>	<p>本剤は、投薬（あるいは投与）期間に関する制限は定められていない。 (V. 治療に関する項目、2. 用法及び用量&lt;用法・用量に関連する使用上の注意&gt;の項を参照)</p>						
<p>16. 各種コード</p>	<table border="1" data-bbox="480 1189 1441 1379"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 1189 794 1279">HOT(9桁)番号</th> <th data-bbox="794 1189 1109 1279">厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード</th> <th data-bbox="1109 1189 1441 1279">レセプト 電算コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 1279 794 1379">117421202</td> <td data-bbox="794 1279 1109 1379">6149003F2224</td> <td data-bbox="1109 1279 1441 1379">621742103</td> </tr> </tbody> </table>	HOT(9桁)番号	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	レセプト 電算コード	117421202	6149003F2224	621742103
HOT(9桁)番号	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	レセプト 電算コード					
117421202	6149003F2224	621742103					
<p>17. 保険給付上の注意</p>	<p>本剤は診療報酬上の後発医薬品である。</p>						

## XI. 文献

1. 引用文献	<ol style="list-style-type: none"><li>1) 第十七改正日本薬局方解説書, C-1515 (廣川書店 2016)</li><li>2) キョーリンリメディオ株式会社社内資料: クラリスロマイシン錠 200mg「杏林」の安定性試験(長期保存試験)に関する資料</li><li>3) キョーリンリメディオ株式会社社内資料: クラリスロマイシン錠 200mg「杏林」の安定性試験(加速試験)に関する資料</li><li>4) キョーリンリメディオ株式会社社内資料: クラリスロマイシン錠 200mg「杏林」の無包装状態での安定性に関する資料</li><li>5) キョーリンリメディオ株式会社社内資料: クラリスロマイシン錠 200mg「杏林」の溶出性に関する資料</li><li>6) 厚生労働省健康局結核感染症課編: 抗微生物薬適正使用の手引き</li><li>7) キョーリンリメディオ株式会社社内資料: クラリスロマイシン錠 200mg「杏林」の生物学的同等性試験に関する資料</li></ol>
2. その他の参考文献	<p>註 1) Griffith, D. E., et al. : Am. J. Respir. Crit. Care Med. , <b>175</b>, 367 (2007)</p> <p>註 2) 厚生労働省: 重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬剤性過敏症症候群</p>

## XII. 参考資料

---

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| 1. 主な外国での発売状況   | 該当しない  |
| 2. 海外における臨床支援情報 | 該当資料なし |



## XII. 備考

---

1. その他の関連資料

該当資料なし