NO.	患者 性・年齢	患者 使用理由（合併症）	1日投与量 投与期間	副作用 経過及び処置	備考
1	男 70代	アルツハイマー型痴呆 （脳梗塞，高尿酸血症，高血圧，便秘，動脈瘤，高脂血症，腎機能障害）	3mg 12日間 ↓ 5mg 25日間	**横紋筋融解** 投与38日前　：脳梗塞後遺症，胃癌にて他院初診。食欲なく，嚥下障害あり。腎機能も低下していた。 （Cr1.51mg/dL，赤血球数415×10^4/mm^3，ヘモグロビン11.9g/dL，ヘマトクリット41.0%） 投与開始日　：本剤3mg投与開始。 投与10日目　：この頃より歩行困難となり，徐々に悪化。 投与13日目　：本剤5mgに増量し，継続。 投与24日目　：この頃より嚥下障害悪化し，嚥下困難となる。その後も徐々に悪化。 投与37日目（投与中止日）：薬剤の投与中止。 中止1日後　：車イスの背もたれにぐったりと寄りかかっているところを発見された。歩行不能の状態となり，他院へ入院。入院時，褐色尿が見られた。入院時の感染症検査未実施。 中止2日後　：CK（CPK）126480IU/Lと著しく高値。BUN26.5mg/dL，Cr2.8mg/dLと腎機能不良。肺炎併発していたためピペラシリンナトリウム2g投与開始。塩酸ロキサチジンアセテート150mg，コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム1000mg投与開始。 中止3日後　：BUN51.4mg/dL，Cr4.93mg/dLのため横紋筋融解症と診断。同日よりCHDF（持続的血液透析濾過）開始。抗生剤投与。 腎機能悪化したため，透析等の目的で本院へ転院。転院時には腎不全も併発しており，尿もほとんど出ていなかった。透析等実施したが，肺炎，血圧低下，末梢循環不全となり，右足壊死。 多臓器不全となるも，そのまま経過。 中止53日後　：死亡。（死因：多臓器不全）	企業報告

臨床検査値

	投与 38日前	中止 2日後	中止 3日後	中止 4日後	中止 5日後	中止 7日後	中止 9日後	中止 35日後	中止 45日後	中止 50日後	中止 53日後
白血球数（/mm^3）	—	16000	19100	22300	14500	15500	11200	15200	16000	12200	17700
好中球（%）	—	96	94	90	94	98	94	—	—	—	—
好酸球（%）	—	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
好塩基球（%）	—	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
単球（%）	—	2	3	5	5	1	4	—	—	—	—
リンパ球（%）	—	2	3	5	1	1	2	—	—	—	—
赤血球数（×10^4/mm^3）	415	459	403	235	286	342	335	—	—	—	—
ヘモグロビン（g/dL）	11.9	12.7	11.5	6.8	8.5	10.1	10.0	7.8	7.9	7.6	8.0
ヘマトクリット（%）	41.0	39.1	34.7	21.0	24.1	29.9	30.1	22.0	21.1	20.6	21.6
血小板数（×10^4/mm^3）	—	21.6	14.4	9.6	5.1	2.7	3.3	12.2	11.9	5.7	3.3
AST（GOT）（IU/L）	—	1233	946	409	2360	709	262	88	57	67	62
ALT（GPT）（IU/L）	—	306	333	220	843	566	302	35	75	95	93
Al-P（IU/L）	—	—	470	317	319	388	291	—	—	—	—
LDH（IU/L）	—	—	2055	1315	2617	1375	781	318	223	216	261
γ-GTP（IU/L）	—	—	42	30	43	74	71	—	—	—	—
総蛋白（g/dL）	—	6.4	6.0	4.0	4.2	4.6	4.7	5.7	4.8	4.9	4.7
BUN（mg/dL）	—	26.5	51.4	46.3	49.0	25.9	43.4	78.2	58.5	50.8	35.3
Cr（mg/dL）	1.51	2.8	4.93	5.46	4.84	2.58	2.77	3.04	2.65	3.13	1.72
Na（mEq/L）	—	133	137	143	145	136	140	—	—	—	—
K（mEq/L）	—	5.9	5.3	5.1	5.5	4.6	4.6	—	—	—	—
尿中ミオグロビン（ng/mL）	—	—	840	—	—	—	—	—	—	—	—

CK（CPK）（IU/L）	—	126480	77350	29580	40500	13057	5235	57	55	27	31
CRP（mg/dL）	—	15.0	20.8	11.4	10.8	29.8	24.6	19.7	17.7	17.4	14.1

併用薬：アスピリン，アロプリノール，ベシル酸アムロジピン，メシル酸ドキサゾシン，酸化マグネシウム，センノシド