

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	備考
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
1	男 40代	右大腿挫 創,破傷 風免疫 (肝硬変)	0.5mL 1回	<b>アナフィラキシー反応,気管浮腫</b> 接種30分後 顔面発赤,そう痒感あり。 接種90分後 全身発赤,顔面浮腫(気管浮腫)あり, O <sub>2</sub> SAT 93%に 低下, 血圧128/74mmHg。点滴処置。 接種5時間後 発赤は軽快。入院を勧めるも拒否,帰宅。 接種1日後 全身のだるさを訴える。採血拒否。翌日の再診,採血 を指示するも,以降来院せず。	企業報告
併用薬:なし					

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	備考
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
2	女 20代	破傷風免 疫 (なし)	0.5mL 1回	<b>アナフィラキシー反応, 意識消失</b> 接種2分後 意識消失, 眼球上転, わずかな痙攣が出現したため, ベッドに移動, 血管確保。血圧99/55mmHg, 脈拍61, SpO <sub>2</sub> 99%(室内気)。顔面潮紅, 胸部聴診にて喘鳴。 接種3分後 意識回復するも, 四肢脱力感著明, 会話中に何度か意識レベル低下。 接種4分後 (意識回復後) SpO <sub>2</sub> 95%で酸素投与開始。 接種17分後 メチルプレドニゾロン125mg静注。速やかに息苦しさは改善, 胸部喘鳴も消失。 接種22分後 血圧82/57mmHg。 接種29分後 エピネフリン0.5mg皮下注。 接種約2時間後 入院。入院時には既に意識は清明。夜にはまだ少しぼーっとするような事があった。 接種約3時間後 血圧108/62mmHg。アナフィラキシー反応に対しては, 入院後追加治療はなく, 補液のみ(乳酸リンゲル液, 維持液)。 接種1日後 意識はほぼ完全に清明。血圧80~90/50~60mmHg(患者通常値)。順調に回復。 接種2日後 血圧90/60mmHg。意識清明, 点滴・薬剤投与なし。 接種3日後 意識清明, 薬剤治療なし。退院。 接種7日後 外来受診。血圧88/58mmHg。	企業報告
併用薬: なし					