

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用							
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置							
1	女 60代	糖尿病 (タバコ使用者, 高血圧)	50mg 34日間	間質性肺炎							
				他院にて, 湿疹に対してエピナスチン塩酸塩とステロイド外用で治療を開始。							
				投与開始日	本剤投与開始。						
				投与数日以内	呼吸困難を自覚。						
				投与33日目	呼吸困難が徐々に進行。気管支鏡検査を施行する目的で入院。						
				投与34日目 (投与中止日)	CTでは肺野に明らかに間質性肺炎の像を呈しており, ステロイドパルス60mg 3日間を開始。本剤投与中止。						
				中止6日後	KL-6 2084U/mL, LDH 394IU/L, CRP 5.4mg/dL。						
				中止40日後	間質性肺炎は軽快。ステロイド30mg/日投与中。LDH 167IU/L。						
中止44日後	KL-6 1457U/mL。										
臨床検査値											
	中止1日後	中止2日後	中止4日後	中止6日後	中止11日後	中止40日後	中止44日後				
白血球数 (/ μ L)	7800	9000	8400	8900	8700	-	-				
ヘモグロビン (g/dL)	12.3	12.3	12.1	12.4	12.8	-	-				
血小板数 ($\times 10^4$ / μ L)	47.7	53.2	47.2	42.8	49.8	-	-				
CRP (mg/dL)	2.91	3.14	3.48	5.4	0.9	-	-				
PT (%)	67.5	-	-	64	-	-	-				
KL-6 (U/mL)	-	-	-	2084	-	-	1457				
LDH (IU/L)	-	-	-	394	-	167	-				
併用薬 : テルミサルタン, 柴陥湯, 呉茱萸湯											