

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
1	男 70代	右腎癌 (高尿酸血症, 高血圧, リン パ節転移, 転 移性肺癌)	800mg 100日間	<b>劇症肝炎</b>	
				投与開始日	本剤の投与開始。
				投与100日目 (投与中止日)	劇症肝炎が発現。本剤の投与中止。 グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤, ウルソデオキシ コール酸の投与開始。黄疸, 肝性脳症の発現あり(昏睡度 2)。
				中止12日後	黄疸増悪。
				中止14日後	腎不全発現。
				中止16日後	血液透析及びビリルビン吸着施行。
中止22日後	未明から意識レベル低下あり。血液透析とビリルビン吸着 予定であったが中止。 正午頃, 肝不全により死亡。 腹部CT検査: (投与94日目) 肝転移なし, 胆: 腫脹を認め る 腹部超音波検査: (中止15日後) 肝: 表面に軽度の凸凹像, 胆: 全周性に肥厚				

**臨床検査値**

	投与 7日前	投与 14日目	投与 42日目	投与 72日目	投与 100日目 (投与中止日)	中止 5日後	中止 15日後	中止 22日後
アルブミン (g/dL)	4.0	4.1	4.4	4.5	3.9	3.2	2.4	2.5
総ビリルビン (mg/dL)	0.5	0.6	0.6	0.5	5.1	8.2	19.0	23.1
AST (GOT)(IU/L)	21	30	132	86	2204	1257	446	59
ALT (GPT)(IU/L)	20	27	240	135	2388	1432	441	111
LDH (IU/L)	205	360	352	295	1085	568	337	608
Al-P (IU/L)	256	260	331	266	769	696	575	407
γ-GTP (IU/L)	19	29	68	60	490	459	192	276
アンモニア (μg/dL)	—	—	—	—	133	—	—	126
プロトロンビン活性 (%)	99	102	103	105	63	73	51	20
アルブミン (g/dL)	4.0	4.1	4.4	4.5	3.9	3.2	2.4	2.5

併用薬: テルミサルタン, 柴陥湯, 呉茱萸湯