

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
1	男 80代	パーキンソン病 (なし)	0.25mg/日 18日間	胸水, 末梢性浮腫, 陰嚢浮腫, 抗利尿ホルモン不適合分泌, 脊椎圧迫骨折 体重: 40kg	
			↓	投与開始日	本剤の投与開始。
			0.5mg/日 126日間	投与約4年目	腰椎圧迫骨折が発現。
			↓	投与1391日目	本剤を3mg/日に増量。
			1.5mg/日 595日間	投与1480日目	大腿から陰嚢にかけて浮腫が発現。 胸水貯留, 呼吸困難もあり入院。
			↓	投与1481日目	本剤を1.5mg/日に減量。 左右下葉に肺全体の4分の1程度の胸水貯留を確認。
			2.25mg/日 651日間	投与1485日目	本剤を0.5mg/日に減量。
			↓	投与1486日目 (投与中止日)	本剤の投与を中断。
			3mg/日 90日間	中止9日後	胸水減少。
			↓	中止12日後 (再投与開始日)	日常生活動作が低下したため, 本剤の投与再開(1.5mg/日)。
			1.5mg/日 4日間	再投与19日目	陰嚢浮腫軽快。 胸水浮腫, 大腿浮腫一旦軽快。
			↓	再投与37日目	再び胸水貯留, 大腿浮腫, SIADHによると思われる低Na血症 (Na: 112mEq/L) を発現。
			0.5mg/日 2日間	再投与46日目 (再投与中止日)	本剤の投与を中止。
			↓	再投与中止1日後	再入院。 右下葉全体および左下葉4分の1程度に胸水貯留。
1.5mg/日 46日間	再投与中止16日後	水制限により, 胸水, 浮腫は改善 (Na: 135mEq/L)。			
	再投与中止17日後	SIADH, 胸水貯留, 大腿浮腫軽快。			
	再投与中止33日後	腰椎圧迫骨折回復するも後遺症(下肢のしびれ)有り。			

臨床検査値

	投与 908日目	投与 1468日目	投与 1480日目	投与 1482日目	中止 5日後	再投与 44日目	再投与中止 1日後	再投与中止 16日後
ADH (pg/mL)	—	—	—	—	—	—	3.4	—
Na (mEq/L)	136	127	125	121	135	112	112	135
Cl (mEq/L)	—	—	93	—	—	76	—	98
Alb (g/dL)	—	—	3.3	—	—	2.7	—	3.1
Hb (g/dL)	—	—	12.6	—	—	11.8	—	11.3
Cre (mg/dL)	—	—	0.46	—	—	0.44	—	0.4
血清浸透圧 (mOsm/L)	—	—	258	—	—	—	232	276
尿中Na (mEq/L)	—	—	63	—	—	—	114	134

併用薬: レボドパ・ベンセラジド塩酸塩, ランソプラゾール, ドロキシドパ, アマンタジン塩酸塩

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用			
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置			
2	男 60代	多系統萎縮症 (高血圧)	0.125 ~ 0.375 mg/ 日 63日間 ↓ 0.75 mg/日 61日間 ↓ 1.5 mg/日 58日間 ↓ 2 mg/日 308日間 ↓ 4 mg/日 27日間	横紋筋融解症			
				体重 : 65kg			
				投与開始日	多系統萎縮症に対し、本剤の投与開始。		
				投与491日目	本剤を4mg/日に増量。		
				投与517日目 (投与中止日)	入浴時に湯船で眠くなり、四肢を動かさず。叫んだが近隣住民は気付かず(本剤投与中止)。		
				中止1日後	翌朝、自力で湯船の栓をひっぱってお湯を抜いた。叫びに気づいた上階の住人が救急車を要請し、病院に搬送。 高CK血症、ミオグロビン血症の判明、筋痛、筋腫脹、筋脱力、筋強剛を認め、横紋筋融解症として入院(CK(CPK) : 11242 IU/L)。 意識障害、著明な発汗、流涎、頻脈などは認めず。 4500mL/日の維持液・細胞外液により補液。		
				中止2日後	2500mL/日の維持液・細胞外液により補液。		
				中止3日後	食事を開始。 高CK血症、ミオグロビン血症は徐々に回復。		
中止9日後	退院(CK(CPK) : 282 IU/L)。						
中止16日後	横紋筋融解症回復。						
臨床検査値							
	投与 498日目	中止 1日後	中止 2日後	中止 3日後	中止 6日後	中止 8日後	中止 9日後
CK (CPK) (IU/L)	203	11242	6617	494	719	280	282
血清ミオグロビン (ng/mL)	—	14073	599	385	95	108	—
AST (GOT) (IU/L)	19	200	157	120	43	28	—
ALT (GPT) (IU/L)	5	69	76	68	44	38	—
LDH (IU/L)	203	625	578	544	434	351	—
Cre (mg/dL)	0.8	0.86	0.79	0.81	0.73	0.78	—
CRP (mg/dL)	0.03	0.31	4.06	4.82	4.93	2.45	—
体温 (°C)	—	38.3	37.7	37.9	37.4	36.6	—
併用薬 : セレギリン塩酸塩, ゾニサミド, レボドパ・カルビドパ水和物, ロピニロール塩酸塩, 酸化マグネシウム, ドンペリドン, アクラトニウムナバジシル酸塩							