

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用								
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置								
1	女 70代	関節リウマチ (高血圧, 浮動性めまい, 上室性期外収縮, 胃炎)	100mg/4週 154日間	<b>間質性肺炎</b>								
				投与開始 12 年前	関節リウマチ発症。							
				投与開始日	本剤 100mg 投与開始。							
				投与 154 日目	本剤 100mg 最終投与。							
				投与 160 日目頃	労作的の呼吸困難出現。							
				投与 167 日目 (発現日)	咳嗽と呼吸困難発現。 【胸部 X 線所見】小粒状影～間質性陰影が出現。 ニューモシスティス肺炎 (PCP) も含めた肺炎を疑われ, 緊急入院。 喀痰検査, β-D-グルカンなど陰性であったが, PCP を疑い, ST 合剤開始。また, 間質性肺炎に対してプレドニゾン 80mg/日投与開始。							
				発現 6 日目	プレドニゾン 40mg/日に減量。							
				発現 10 日目	プレドニゾン 20mg/日に減量。							
				発現 13 日目	プレドニゾン 10mg/日に減量。							
				発現 17 日目	気管支鏡検査行うも PCP-PCR 陰性。再び肺症状および CRP 上昇がみられた。							
				発現 18 日目	プレドニゾン 30mg/日に増量。							
				発現 32 日目	プレドニゾン 27mg/日に減量。							
				発現 39 日目	間質性肺炎は回復し, 退院した。 本剤の再投与は無し。							
<b>臨床検査値</b>												
	投与開始 2 日前	投与 154 日目	投与 167 日目 (発現日)	発現 2 日目	発現 4 日目	発現 12 日目	発現 15 日目	発現 19 日目	発現 26 日目	発現 30 日目		
CRP (mg/dL)	0.0	0.5	3.1	2.9	0.5	0.2	0.7	0.1	0.0	0.0		
KL-6 (U/mL)	—	374	—	1,280	—	—	—	—	—	1,280		
併用薬: インダパミド, バルサルタン, アムロジピンベシル酸塩, ピルシカイニド塩酸塩水和物, ビソプロロール fumarate 酸塩, アスピリン・ダイアルミネート, イルソグラジンマレイン酸塩, モサプリドクエン酸塩水和物												