

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用		
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置		
1	男 70代	糖尿病 (狭心症, 高血 圧, 高脂血症)	100mg 113日間	間質性肺炎		
				投与開始日	本剤100mg/日の投与開始。	
				投与 113 日目 (投与中止日)	呼吸困難にて当院救急部受診。採血, レントゲン, CTにて間質性肺炎と診断。低酸素血症にて同日緊急入院。ステロイドパルス療法開始。	
				中止 2 日後	ステロイドパルス療法終了。	
				中止 3 日後	プレドニゾロン30mg投与開始。	
				中止 19 日後	ステロイドに対する反応良く, 肺の間質影は徐々に改善。ステロイド減量し, 退院。 入院中に施行したDLST検査にて, 本剤陽性, エゼチミブ陰性と判明。	
臨床検査値						
	検査項目	投与 64 日目	投与 113 日目 (投与中止日)	中止 9 日後	中止 17 日後	中止 30 日後
	赤血球数 (x10 ⁴ /mm ³)	449	446	439	453	426
	ヘモグロビン (g/dL)	13.8	13.4	13.1	13.6	12.9
	ヘマトクリット値 (%)	41.3	39.2	34.2	40.3	38.9
	白血球数 (/mm ³)	6,400	8,900	9,400	11,700	8,500
	好中球 (%)	62.9	84.9	77.8	81.6	79.2
	好酸球 (%)	10.0	2.2	1.3	0.5	1.4
	好塩基球 (%)	0.6	0.1	0.2	0.2	6.2
	単球 (%)	6.8	5.7	5.9	4.7	4.1
	リンパ球 (%)	19.7	7.1	14.8	13.0	15.1
	血小板数 (x10 ⁴ /mm ³)	22.1	32.6	34.4	26.9	21.6
	AST (GOT) (IU/L)	21	30	16	17	19
	ALT (GPT) (IU/L)	22	13	23	23	30
	γ-GTP (IU/L)	29	22	32	41	40
	LDH (IU/L)	154	526	232	231	237
	BUN (mg/dL)	17	11	23	20	26
	クレアチニン (mg/dL)	1.34	1.14	1.24	1.22	1.03
	KL-6 (U/mL)	—	1,626	1,834	1,805	1,352
	SP-D (ng/mL)	—	—	86.3	41.0	17.2
併用薬 : アスピリン, エゼチミブ, ビソプロロールフマル酸塩, テルミサルタン, 一硝酸イソソルビド, ニフェジピン, シロスタゾール, グリメピリド, フェノフィブラート						