

症例の概要

| No. | 患者 | | 1日投与量 投与期間 | 副作用 |
|-----|----------|--|--|---|
| | 性・ 年齢 | 使用理由 (合併症) | | 経過及び処置 |
| 1 | 女 70代 | C型慢性肝炎 (高血圧, 骨 粗鬆症, う つ病, 高コ レステロール血症) | ダクルイン ザ錠: 60mg スンベプラ カプセル: 200mg 14日間 | <p>多形紅斑 前治療歴: ベグインターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え) +リバビリン 既往歴: 薬疹 (抗生物質)</p> <p>投与約19年前 C型慢性肝炎と診断 投与開始日 ダクルインザ錠60mg 1日1回及びスンベプラカプセル100mg 1日2回の2剤併用療法開始。</p> <p>投与12日目 39度の発熱が発現。 投与14日目 その後も微熱が続き外来受診。軽度の黄疸が認められた。 投与15日目 同日朝より全身に蕁麻疹様の紅斑を認め, 再度受診。特に上腕の筋肉痛を訴えた。CPK: 767 IU/L。体幹部と四肢の多形滲出性紅斑と診断。 (投与中止日) ダクルインザ錠及びスンベプラカプセル投与中止。ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム200mgおよび生理食塩水100mLを点滴投与, グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤注射液60mL /日を投与。同治療を中止1日後および中止3日後にも施行。 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg/日投与開始。 中止1日後 プレドニゾロン30mg/日内服開始。 中止3日後 発熱回復。 中止4日後 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg /日投与終了。 中止6日後 プレドニゾロン20mg/日に減量。 中止14日後 多形滲出性紅斑, 黄疸, 筋肉痛及びCPK上昇は回復。 中止18日後 プレドニゾロン10mg/日に減量。 中止28日後 プレドニゾロン5mg/日に減量。</p> |

臨床検査値

| | 投与開始日 | 投与14日目 | 投与15日目 (投与中止日) | 中止14日後 |
|--------------------------|-------|--------|-------------------|--------|
| 白血球数 (/mm ³) | 3,700 | 7,100 | 10,400 | 8,700 |
| リンパ球 (%) | — | — | 10 | 15 |
| 好中球 (%) | — | — | 84 | 80 |
| CRP (mg/dL) | — | — | 4.53 | ≤0.05 |
| AST (IU/L) | 75 | 26 | 40 | 19 |
| ALT (IU/L) | 56 | 20 | 30 | 16 |
| Al-P (IU/L) | 265 | — | 201 | 346 |
| γ-GTP (IU/L) | 20 | 29 | 50 | 30 |
| 総ビリルビン (mg/dL) | 1.2 | 2.9 | 3.6 | 0.9 |
| 血中クレアチニン (mg/dL) | 0.48 | 0.59 | 1.16 | 0.54 |
| クレアチンキナーゼ (IU/L) | — | — | 767 | 35 |
| IgE (mg/dL) | — | 35 | — | — |
| IgM (mg/dL) | — | 57 | — | — |
| IgG (mg/dL) | — | 1,365 | — | — |

併用薬: カンデサルタンシレキセチル, アルファカルシドール, タウリン

症例の概要

| No. | 患者 | | 1日投与量 投与期間 | 副作用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---|---|--|---------------|-------------------------|-------|---------|------|--------|-----|--------|------|------------|------|-----------|----|-----------|----|-------------|----|---------------|-----|-----------------|------|
| | 性・ 年齢 | 使用理由 (合併症) | | 経過及び処置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 女 50代 | C型慢性肝炎 (甲状腺機能 低下症) | ダクルインザ 錠：60mg スンベプラ カプセル： 200mg 38日間 | <p>多形紅斑 前治療歴：インターフェロンアルファ-2b（遺伝子組み換え）+リバビリン ペグインターフェロンアルファ-2b（遺伝子組み換え）+リバビリン</p> <p>投与開始日 ダクルインザ錠60mg 1日1回及びスンベプラカプセル100mg 1日2回の2剤併用療法開始。</p> <p>投与37日目 皮疹が発現。</p> <p>投与39日目 皮疹が徐々に増悪，救急外来を受診。多形滲出性紅斑と診断 (投与中止日) され入院。 皮膚科医の所見：眼瞼結膜，眼球結膜，口腔粘膜に異常なし。 顔面及び上半身に斑状の多形滲出性紅斑を認める。 ダクルインザ錠及びスンベプラカプセルの投与中止。 ステロイドパルス療法開始（投与中止2日後まで）。</p> <p>中止3日後 プレドニゾン40mg内服開始。</p> <p>中止8日後 多形滲出性紅斑は軽快。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>臨床検査値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>投与39日目（投与中止日）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>白血球数（/mm³）</td> <td>5,600</td> </tr> <tr> <td>リンパ球（%）</td> <td>24.0</td> </tr> <tr> <td>好酸球（%）</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>好中球（%）</td> <td>70.9</td> </tr> <tr> <td>CRP（mg/dL）</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>AST（IU/L）</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>ALT（IU/L）</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>γ-GTP（IU/L）</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>総ビリルビン（mg/dL）</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>血中クレアチニン（mg/dL）</td> <td>0.63</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 投与39日目（投与中止日） | 白血球数（/mm ³ ） | 5,600 | リンパ球（%） | 24.0 | 好酸球（%） | 0.5 | 好中球（%） | 70.9 | CRP（mg/dL） | 0.03 | AST（IU/L） | 35 | ALT（IU/L） | 24 | γ-GTP（IU/L） | 45 | 総ビリルビン（mg/dL） | 1.3 | 血中クレアチニン（mg/dL） | 0.63 |
| | 投与39日目（投与中止日） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白血球数（/mm ³ ） | 5,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リンパ球（%） | 24.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 好酸球（%） | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 好中球（%） | 70.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRP（mg/dL） | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AST（IU/L） | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALT（IU/L） | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| γ-GTP（IU/L） | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総ビリルビン（mg/dL） | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血中クレアチニン（mg/dL） | 0.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 併用薬：ウルソデオキシコール酸，アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム，レボチロキシナトリウム水和物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |