

症例の概要

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置
1	女 40代	アレルギー 性鼻炎 (アレルギー 性鼻炎, 上 気道感染)	フェキソフェ ナジン塩酸 塩120mg/ 塩酸プソイド エフェドリン 240mg 3日間 ↓ 投与なし 10日間 ↓ フェキソフェ ナジン塩酸 塩120mg/ 塩酸プソイド エフェドリン 240mg 3日間	<p>急性汎発性発疹性膿疱症</p> <p>投与開始日 アレルギー性鼻炎に対し, 本剤及びレボセチリジン塩酸塩(～中止1日後まで)処方。 急性上気道炎に対し, メシル酸ガレノキサシン水和物及びア ンブロキソール塩酸塩処方(～投与5日目まで)。</p> <p>投与3日目 発熱, 全身の紅斑出現。近医受診。 本剤投与中止。セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物, ベタ メタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩, ステロイド軟 膏処方。 症状軽快。</p> <p>投与14日目 本剤内服再開。</p> <p>投与16日目 発熱, 全身の紅斑出現。近医受診。 (投与中止日) 本剤投与中止。セフジトレン ピボキシル, レボセチリジン 塩酸塩, ベタメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩処 方するも変わらず。</p> <p>中止1日後 皮膚科紹介。38℃の発熱。全身に潮紅の強い紅斑があり, 膿 瘍を伴う紅斑も見られた。同日入院。</p> <p>中止2日後 プレドニゾロン20mg/日内服。速やかに解熱し, 皮疹も軽快。</p> <p>皮膚病理組織診断 水疱部: 部分的不全角化, 角層好中球膿瘍あり, 表皮細胞間 浮腫と表皮下水疱あり, 真皮表層浮腫と連続水疱内 は好中球あり。真皮血管とその周囲真皮びまん性に 好中球組織球浸潤あり。核片形成内皮腫大も目立つ。 単細胞壊死は乏しい。 潮紅の強い紅斑部: 真皮表層浮腫～水疱の程度が軽い。 Erythema multiformeに近い像。薬疹に 特に矛盾しない。</p> <p>中止6日後 退院。</p> <p>中止13日後 皮疹ほとんどなく軽快。</p> <p>中止41日後 パッチテスト: フェキソフェナジン塩酸塩 (1%, 10%, 30%) 48hr (-), 72hr (-) 本剤 (1%, 10%, 30%) 48hr (+), 72hr (+) DLST: フェキソフェナジン塩酸塩 S.I. 107% (-) 本剤 S.I. 180% (-)</p>
併用薬: レボセチリジン塩酸塩, メシル酸ガレノキサシン水和物, アンブロキソール塩酸塩				