

症例の概要

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用				
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置				
1	男 20代	てんかん (精神障害者)	250mg 33日間 ↓ 375mg 35日間 ↓ 500mg 10日間	急性腎不全 フェニトイン、ゾニサミドに加えて、本剤250mg/日を追加投与。  投与34日目 本剤375mg/日に増量。 投与69日目 本剤500mg/日に増量 若干眠気あるも全身状態良好。 投与78日目 2日前から嘔吐・活気不良あり受診。検査で腎不全と診断され入院。本剤投与中止。 投与中止翌日 安静と水分管理（水分制限）のみで経過観察。 投与中止14日後 上記対応のみで回復し退院。				
<b>臨床検査値</b>								
				投与 43日前	投与78日目 (投与中止日)	投与中止 翌日	投与中止 5日後	投与中止 13日後
			BUN (mg/dL)	10	37	41	12	10
			血清クレアチニン (mg/dL)	0.79	5.82	6.75	1.31	0.86
			血中ナトリウム (mEq/L)		130	128	140	141
			血中カリウム (mEq/L)		3.5	3.8	4	3.9
			尿蛋白	—	3+	2+		—
			尿潜血	—	1+	2+		
			尿中β2ミクログロブリン (mg/dL)		16.776	11.353	0.442	
			シスタチンC		3.44	3.07		
併用薬：フェニトイン、ゾニサミド								