

症例の概要

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用	
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置	
1	男 1歳 未満	脊髄性筋萎縮症 (脳室拡大, 軽度の脳幹萎縮)	4 ml (1回目) 4.3ml (2回目) 4.3ml (3回目)	水頭症 投与14日前 投与開始日 投与16日後 投与30日後 投与32日後 投与35日後 投与42日後 投与46日後 投与50日後 投与51日後 投与56日後 投与77日後	頭囲 (+0.6SD) 本剤を投与開始。 本剤2回目の投与。 本剤3回目の投与。 頭囲拡大を指摘される (+2.4SD) 超音波検査(頭部)にて著明な脳室拡大を認め水頭症と診断された。投与開始9週目以後の本剤の投与を中止。 頭部MRIにて著明な脳室拡大, 中脳水道は開存しており交通性水頭症と診断された。 外転障害, 落陽現象を時々認めるようになる。 V-Pシャント術施行。 脳室拡大改善傾向。外転障害, 落陽現象消失。哺乳改善傾向。 頭囲 (+2.3SD)。眼球運動障害改善傾向。軽度哺乳低下残存。 眼球運動は回復。頭囲は縮小傾向 (+1.8SD)。
併用被疑薬: なし 併用薬: なし					