

## ウブレチド錠 5mg

## 【この薬は？】

販売名	ウブレチド錠 5mg UBRETID TAB. 5mg
一般名	ジスチグミン臭化物 Distigmine
含有量 (1錠中)	ジスチグミン臭化物 5mg

## 患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

## 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、コリンエステラーゼ阻害薬と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、排尿障害治療剤として処方される場合、アセチルコリンエステラーゼを阻害する作用により、膀胱の筋肉の働きを強め、排尿障害を改善します。重症筋無力症治療剤として処方される場合、アセチルコリンエステラーゼを阻害する作用により、全身の筋肉の働きを強め、重症筋無力症における症状を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。  
手術後及び神経因性膀胱などの低緊張性膀胱による排尿困難（手術後や膀胱の動きを調節している神経が障害を受けている状態によって尿の出が悪くなっている人）  
重症筋無力症
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断し、服用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○この薬を使用することにより、意識障害を伴う重篤なコリン作動性クリーゼが発現し、中には死亡にいたる例も報告されています。患者や家族の方は、コリン作動性クリーゼ（初期症状として、悪心（吐き気）・嘔吐（おうと）、腹痛、下痢、唾液分泌過多（つばが多くなる）、気道分泌過多（痰が多くなる）、発汗（汗がたくさん出る）、徐脈（脈が遅くなる）、縮瞳（瞳孔が小さくなる）、呼吸困難（息苦しい、息切れ）など）があらわれることがあることを十分に理解できるまで説明を受けてください。これらのコリン作動性クリーゼを思わせる初期症状があらわれたら、ただちに飲むのをやめ、医師に連絡し、指示に従ってください。

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・消化管または尿路に閉塞のある人
- ・迷走神経緊張症の人
- ・脱分極性筋弛緩剤（スキサメトニウム）を使用している人
- ・過去にウブレチド錠に含まれる成分で過敏症のあった人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・コリン作動薬やコリンエステラーゼ阻害薬を使用している人
- ・気管支喘息がある人
- ・甲状腺の機能が亢進している人
- ・徐脈・心疾患（冠動脈疾患、不整脈）がある人
- ・消化性潰瘍がある人
- ・てんかんがある人
- ・パーキンソン症候群の人
- ・腎臓に障害がある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用してはいけない薬〔脱分極性筋弛緩剤（スキサメトニウム塩化物水和物製剤、販売名：スキサメトニウム注、レラキシシン注）〕や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

疾患名	手術後及び神経因性膀胱などの低緊張性膀胱による排尿困難	重症筋無力症
1回量	1錠	1錠
開始量	1錠	1錠
維持量	1錠	1～4錠
飲む回数	1日1回	1日1～4回

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。指示された時間に飲み忘れたら、1回とばして次の指示された時間に1回分を服用してください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

誤って多く使用した場合、悪心（吐き気）・嘔吐（おうと）、腹痛、下痢、唾液分泌過多（つばが多くなる）、気道分泌過多（痰が多くなる）、発汗（汗がたくさん出る）、徐脈（脈が遅くなる）、縮瞳（瞳孔が小さくなる）、呼吸困難（息苦しい、息切れ）などの症状があらわれるおそれがありますので、いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、使用を中止し、ただちに受診してください。コリン作動性クリーゼの場合には、治療薬としてアトロピン硫酸塩水和物が投与されます。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を使用することにより、意識障害を伴うコリン作動性クリーゼがあらわれることがあります。投与開始2週間以内で多くあらわれていることから、特に投与開始2週間はコリン作動性クリーゼの症状（初期症状として悪心（吐き気）・嘔吐（おうと）、腹痛、下痢、唾液分泌過多（つばが多くなる）、気道分泌過多（痰が多くなる）、発汗（汗がたくさん出る）、徐脈（脈が遅くなる）、縮瞳（瞳孔が小さくなる）、呼吸困難（息苦しい、息切れ）など）に注意してください。また、この薬を長い間飲んでいてもこのような症状が見られることがあります。コリン作動性クリーゼの症状が出てきたら、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。
- ・重症筋無力症の患者さんで、上記に加え、筋無力症の症状の重篤な悪化、呼吸困難（息苦しい、息切れ）、嚥下障害（ものが飲み込みにくい）、唾液排出困難、チアノーゼ（唇が青紫色になる、手足の指先が青紫色になる）、全身の脱力などが見られることがあります。このような症状があらわれたら、ただちに受診してください。

- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。
- ・高齢の人では、肝・腎機能が低下していることが多く、体重が少ない傾向があるなど副作用が発現しやすいため、コリン作動性クレーゼの症状に注意してください。

## 副作用は？



特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
コリン作動性クレーゼ コリンさどうせいクレーゼ	下痢、腹痛、吐き気、嘔吐（おうと）、唾液の量が増加、発汗、呼吸困難（息苦しい、息切れ）、脈が遅くなる、縮瞳（瞳孔が小さくなる）、意識の低下
狭心症 きょうしんしょう	しめ付けられるような胸の痛み、胸を強く押さえつけられた感じ、冷汗が出る、あごの痛み、左腕の痛み
不整脈（心室頻拍、心房細動、房室ブロック、洞停止） ふせいみやく（しんしつひんぱく、しんぼうさいどう、ぼうしつぷろっく、どうていし）	めまい、動悸（どうき）、脈がとぶ、脈が遅くなる、気を失う、胸の不快感、立ちくらみ、息切れ

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発汗、冷汗が出る
頭部	意識の低下、気を失う、めまい、立ちくらみ
顔面	あごの痛み
眼	縮瞳（瞳孔が小さくなる）
口や喉	吐き気・嘔吐（おうと）、唾液の量が増加
胸部	動悸（どうき）、呼吸困難（息苦しい、息切れ）、しめ付けられるような胸の痛み、胸を強く押さえつけられた感じ、胸の不快感、息切れ
腹部	腹痛
手・足	脈がとぶ、脈が遅くなる、左腕の痛み
便	下痢

## 【この薬の形は？】

形状	円形の錠剤（割線入り） 
PTPシート	
直径	9.0mm
厚さ	3.0mm
重さ	250mg
色	白色
識別コード	TO 067

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ジスチグミン臭化物
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、タルク、ステアリン酸マグネシウム

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：鳥居薬品株式会社 (<https://www.torii.co.jp>)

お客様相談室

電話：0120-316-834

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他休業日を除く）