

# 患者向医薬品ガイド

2024年11月更新

## ルムジェブ注カート ルムジェブ注ミリオペン ルムジェブ注ミリオペンHD

### 【この薬は?】

販売名	ルムジェブ注 カート LYUMJEV	ルムジェブ注 ミリオペン LYUMJEV	ルムジェブ注 ミリオペン HD LYUMJEV
一般名	インスリン リスプロ (遺伝子組換え) Insulin Lispro (Genetical Recombination)		
含有量 (1 製剤中)	300 単位		

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知りたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は?】

- この薬は、超速効型インスリンアナログ製剤と呼ばれるグループに属する注射薬です。
- この薬は、細胞内への糖の取り込み、肝臓での糖新生の抑制、および肝臓、筋肉におけるグリコーゲン合成の促進作用などにより血糖値を下げます。
- この薬は、同じ有効成分を含むヒューマログ注より、血糖降下作用が速く発現するよう製剤学的工夫がされています。
- 次の病気の人には処方されます。

## インスリン療法が適応となる糖尿病

- ・ 2型糖尿病においては急を要する場合以外は、あらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分行なったうえで、医師の判断により処方されます。
- ・ この薬は他の持続型インスリン製剤と併用されることがあります。  
この薬は、医療機関において、適切な在宅自己注射教育を受けた患者さんまたは家族の方は、自己注射できます。自己判断で使用を中止したり、量を加減したりせず、医師の指示に従ってください。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人には、この薬を使用することはできません。

- ・ 低血糖症状のある人
- ・ 過去にルムジェブ注およびヒューマログ注に含まれる成分で過敏症のあった人

○次の人には、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・ 手術を受けた人、外傷を受けた人、感染症にかかっている人
- ・ 低血糖を起こしやすい次の  
  - ・ 脳下垂体機能に異常のある人、副腎機能に異常のある人
  - ・ 下痢、嘔吐（おうと）などの胃腸障害のある人
  - ・ 飢餓状態の人、食事が不規則な人
  - ・ 激しい筋肉運動をしている人
  - ・ 飲酒量の多い人
- ・ 自律神経に障害のある人
- ・ 腎臓に重篤な障害がある人
- ・ 肝臓に重篤な障害がある人
- ・ 妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・ 授乳中の

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。


## 【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

### ●使用量および回数

使用量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人では1回2～20単位を毎食事開始時（食事開始前の2分以内）に皮下注射しますが、必要な場合は投与時間を食事開始後（食事開始から20分以内）にすることもできます。ときに注射回数を増やしたり、持続型インスリン製剤と併用したりすることができます。持続型インスリン製剤の使用量を含めた維持量としては通常1日4～100単位です。



この薬はヒューマログ注より血糖降下作用の発現が速いため、食事開始時（食事開始前の2分以内）に注射してください。食事開始後に注射する場合は、食事開始から20分以内にしてください。

### ●どのように使用するか？

- 皮下注射します。詳しくは、取扱説明書を参照してください。

[ルムジェブ注カート（カートリッジ製剤）]


- 必ず専用のインスリンペン型注入器を用いて使用してください。

[ルムジェブ注ミリオペン/ミリオペンHD（ミリオペン製剤）]

- カートリッジ製剤と使い捨てのできるインスリンペン型注入器との一体型です。
- 注射針は必ずJIS T 3226-2に準拠したA型専用注射針を使用してください。
- 本剤とA型専用注射針との装着時に液漏れなどの不具合が認められた場合には、新しい注射針に取り替えてください。

[この薬を使用する全ての人に共通]

- ・本剤のカートリッジにインスリン製剤を補充したり、他のインスリン製剤と混合してはいけません。
- ・注射のたびに新しい注射針を使用してください。
- ・一本のインスリンペン型注入器およびカートリッジを他の人と共用しないでください。
- ・皮下注射は、腹部、大腿部（だいたいぶ）、上腕部、臀部（でんぶ）などに行います。同じ部位に注射を行う場合は、前回の注射箇所から2～3cm離して注射してください。



- ・静脈内に注射しないでください。皮下注射したとき、まれに注射針が血管内に入り、注射後直ちに低血糖があらわれることがあるので注意してください。
- ・使用済みの注射針は、取り外した針先が突き出ないような安全な容器に入れた後、子供の手の届かないところに保管してください。

●**使用し忘れた場合の対応**

- ・決して2回分を一度に注射しないでください。
- ・注射をし忘れた場合は、医師に相談してください。

●**多く使用した時（過量使用時）の対応**

- ・低血糖症状（お腹がすく、冷汗が出る、血の気が引く、疲れやすい、手足のふるえ、けいれん、意識の低下など）があらわれる可能性があります。
- ・低血糖症状が認められるものの、意識障害がない場合は、糖質を含む食品をとってください。 $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤（アカルボース、ボグリボース、ミグリトール）を併用している場合は、ブドウ糖をとってください。  
意識が薄れてきた場合は、医師に連絡してください。
- ・低血糖症状の一つとして意識障害をおこす可能性もありますので、この薬を使用していることを必ずご家族やまわりの方にも知らせてください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは?】

- ・ この薬を使用するにあたっては、注射法や低血糖症状への対処法、器具の安全な廃棄方法などについて、患者さんまたは家族の方は十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・ この薬は、血糖降下作用発現が速いため、ヒューマログ注と比べて低血糖が早く発現する可能性があります。
- ・ 指示された時間に食事をとらなかつたり、食事の量が少なかつたり、予定外の激しい運動を行った場合、低血糖症状があらわれることがあります。低血糖症状に関する注意を必ずご家族にも知らせてください。低血糖症状が認められるものの、意識障害がない場合は、糖質を含む食品をとってください。 $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤（アカルボース、ボグリボース、ミグリトール）を併用している場合は、ブドウ糖をとってください。意識が薄ってきた場合は、医師に連絡してください。**副作用は?**に書かれていることに特に注意してください。
- ・ 肝機能障害（疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振）があらわれることがあるので、これらの症状があらわれたら受診してください。
- ・ 急激な血糖のコントロールに伴い、糖尿病網膜症があらわれたり、悪化したり、目の屈折異常がおこったり、痛みを伴う神経障害があらわれることがあります。
- ・ この薬と他のインスリン製剤を取り違えないように、毎回注射する前にラベルなどを確認してください。
- ・ 同じ箇所に繰り返し注射すると、注射部位に皮膚アミロイドーシスやリポジストロフィー（注射した箇所のしこり）ができることがあります。前回注射した箇所より2～3cm離して注射してください。しこりが出来た場合は、しこりへの注射は避けてください。しこりに注射した場合、充分な血糖コントロールが得られなくなることがあります。
- ・ 高所での作業や自動車の運転など、危険を伴う作業に従事しているときに低血糖を起こすと事故につながるおそれがありますので、特に注意してください。
- ・ 妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・ 授乳している人は医師に相談してください。
- ・ 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれるることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
低血糖 ていけつとう	お腹がすく、冷汗が出る、血の気が引く、疲れやすい、手足のふるえ、けいれん、意識の低下
アナフィラキシーショック	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、冷汗が出る、めまい、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる
血管神経性浮腫 けっかんしんけいせいふしゅ	唇・まぶた・舌・口の中・顔・首が急に腫れる、喉がつまる感じ、息苦しい、声が出にくく

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	冷汗が出る、疲れやすい、けいれん、ふらつき
頭部	意識の低下、めまい
顔面	血の気が引く、顔面蒼白、唇・まぶた・舌・口の中・顔・首が急に腫れる
口や喉	喉のかゆみ、喉がつまる感じ、声が出にくく
胸部	動悸、息苦しい
腹部	お腹がすく
手・足	手足のふるえ、手足が冷たくなる
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

## 【この薬の形は？】

販売名	容器の性状
ルムジェブ注カート	
ルムジェブ注ミリオペン	
ルムジェブ注ミリオペン HD	

- 性状 : 無色透明の液
- 内容量 : 3mL

インスリンペン型注入器



## 【この薬に含まれているのは?】

有効成分	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
添加剤	濃グリセリン、塩化マグネシウム、m-クレゾール、クエン酸ナトリウム水和物、トレプロスチニルナトリウム、酸化亜鉛、pH調節剤

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は?

[ルムジェブ注カート（カートリッジ製剤）]

- ・凍結を避けて冷蔵庫など(2~8°C)で保管してください。光を避けてください。
- ・カートリッジをインスリンペン型注入器に装着したまま、冷蔵庫に保管しないでください。
- ・使用開始後は室温（30°C以下）で保存し、28日以内に使用してください。

[ルムジェブ注ミリオペン/ミリオペンHD（ミリオペン製剤）]

- ・凍結を避けて冷蔵庫など(2~8°C)で保管してください。光を避けてください。
- ・使用開始後は冷蔵庫に保管せず、室温（30°C以下）で保存し、28日以内に使用してください。

[この薬を使用する全ての人に共通]

- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら?

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

### ●廃棄方法は?

- ・使用済みのカートリッジ・ミリオペンおよび使い捨て注射針については、医療機関の指示どおりに廃棄してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は?】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：日本イーライリリー株式会社 (<https://www.lilly.com/jp>)

日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口

Lilly Answers（リリーアンサーズ）

電話：0120-245-970（一般の方、患者様向け）

受付時間：8時45分～17時30分

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）