2025年2月更新

# ネオキシテープ73.5mg

## 【この薬は?】

| 販売名   | ネオキシテープ73. 5mg           |
|-------|--------------------------|
|       | NEOXY Tapes 73.5mg       |
| 一般名   | オキシブチニン塩酸塩               |
|       | Oxybutynin Hydrochloride |
| 含有量   | ロローナン、ゴイーンは歌性スの          |
| (1枚中) | 日局オキシブチニン塩酸塩73.5mg       |

## 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解 と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤 師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。 さらに詳しい情報として、 PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」 https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html に添付文書情報が 掲載されています。

## 【この薬の効果は?】

- ・この薬は、過活動膀胱治療剤と呼ばれるグループに属する貼り薬です。
- ・この薬は、皮膚を通して少しずつ体内に吸収され、膀胱に作用して尿意切迫感、 頻尿および切迫性尿失禁を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。

#### 過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁

・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。<u>指示どおりに使用し続けること</u>が重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは?】

- **〇**次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・ 尿閉 (尿が出ない) がある人
  - ・ 閉塞隅角緑内障の人
  - ・心臓に重篤な障害がある人
  - ・幽門、十二指腸または腸管が閉塞している人および麻痺性イレウスのある人
  - ・胃アトニーまたは腸アトニーのある人
  - ・ 重症筋無力症の人
  - ・過去にネオキシテープに含まれる成分で過敏症のあった人
  - ・授乳中の人
- ○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてくだ さい。
  - ・下部尿路閉塞疾患(前立腺肥大症など)にかかっている人
  - ・甲状腺機能亢進症の人
  - ・うっ血性心不全の人
  - 不整脈のある人
  - ・ 潰瘍性大腸炎の人
  - ・パーキンソン症状または脳血管障害のある人
  - ・認知症または認知機能(記憶力、判断力、計算力等)障害のある人
  - ・腎臓に重篤な障害のある人
  - ・肝臓に重篤な障害のある人
  - 妊婦または妊娠している可能性のある人
- ○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新た に使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- ○下部尿路閉塞疾患(前立腺肥大症など)にかかっている人は、この薬の使用前に 残尿量測定などの検査が行われます。

## 【この薬の使い方は?】

#### ●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。通常、成人の 使う量および回数は、次のとおりです。

| 貼る回数 | 1日1回                        |
|------|-----------------------------|
|      | 毎日ほぼ同じ時間に (24 時間毎に) 貼り替えます。 |
| 1 回量 | 1 枚                         |


#### ●どのように使用するか?

- ・皮膚症状があらわれることがあるので、貼る場所を毎回変えてください。
- ・下腹部、腰部または大腿部のいずれかに貼ってください。
- ベルトなどがあたる場所は避けて貼ってください。
- ・傷または湿疹・皮膚炎などのある場所には貼らないでください。
- ・あらかじめ貼る場所の水分や汗を十分に拭き取ってください。
- ・入浴などの時間を考慮して貼り替えてください。

### <ネオキシテープ73.5mgの貼り方>

・この薬を貼り替える時は、前日に貼った薬をはがしてから、新しい薬を 貼ってください。





#### ●はがれた場合の対応

薬が途中ではがれた場合は、ただちに新しい薬を貼ってください。次の貼り替え はいつもと同じ時間にしてください。

### ●貼り忘れた場合の対応

貼り忘れや貼り替えていないことに気づいた場合でも、決して2回分を一度に貼らないでください。気づいた時にすぐに貼り替えて、次回からはいつもと同じ時間に貼り替えてください。

### ●多く使用した時(過量使用時)の対応

尿閉(尿が出ない)、散瞳(物が見えにくい、まぶしい)、興奮、頻脈(胸がどきどきする、めまい、動悸(どうき))などの症状があらわれる可能性があります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、薬をはがし、ただちに受診してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは?】

- ・目の調節障害(視力障害、目がかすれるなど)、めまい、眠気があらわれる可能性がありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に注意してください。
- ・下部尿路閉塞疾患(前立腺肥大症など)にかかっている人は、必要に応じて、残尿量測定などの検査が行われることがあります。
- ・皮膚症状があらわれることがありますので、貼る場所を毎回変えてください。皮膚症状があらわれた場合には、薬をはがし、ただちに医師に連絡してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- 授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬 を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

# 副作用は?

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

| 重大な副作用                         | 主な自覚症状   |
|--------------------------------|--|
| 血小板減少 けっしょうばんげんしょう             | 鼻血、唾液、痰に血が混じる、血を吐く、歯ぐきから<br>の出血、あおあざができる、出血が止まりにくい |
| 麻痺性イレウス<br><sup>まひせいイレウス</sup> | 便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐(おうと)、お腹が張る                       |
| 尿閉<br>にょうへい                    | 尿が出ない  |

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

| 部位  | 自覚症状                                |
|-----|-------------------------------------|
| 全身  | 出血が止まりにくい                           |
| 顔面  | 鼻血                                  |
| 口や喉 | 吐き気、嘔吐、唾液、痰に血が混じる、血を吐く、歯ぐきか<br>らの出血 |
| 腹部  | お腹が張る                               |
| 皮膚  | あおあざができる                            |
| 便   | 便やおならが出にくい                          |
| 尿   | 尿が出ない                               |

# 【この薬の形は?】

| 包装袋 形状 |                                |
|--------|--------------------------------|
|        | 本才学》于一步<br>-73.5mg<br>1日1日3枚贴付 |
| 大きさ    | 73.0mm×73.0mm                  |
| 色      | 淡褐色~褐色 (支持体)、半透明 (膏体)          |
| におい    | 特異なにおいがある                      |
| 識別コード  | HP3191T                        |

# 【この薬に含まれているのは?】

| 有効成分 | 日局オキシブチニン塩酸塩                   |
|------|--------------------------------|
| 添加剤  | 香料 (フェニルエチルアルコール)、脂環族飽和炭化水素樹脂、 |
|      | スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、流動パ    |
|      | ラフィン、ポリイソブチレン、その他4成分           |

# 【その他】

### ●この薬の保管方法は?

- ・直射日光と湿気を避けて室温(1~30℃)で保管してください。
- ・開封後は開封口のチャックをしめて保管し、開封日より14日を越えたものは使用しないでください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら?

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

#### ●廃棄方法は?

・接着面を内側にして折りたたみ、子供の手および目の届かない所に廃棄してく ださい。

# 【この薬についてのお問い合わせ先は?】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社: 久光製薬株式会社(https://www.hisamitsu.co.jp/)

お客様相談室

TEL. 0120-133250 受付時間/9:00-17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)