

ネオキシテープ 73.5mg

【この薬は？】

販売名	ネオキシテープ 73.5mg NEOXY TAPE 73.5mg
一般名	オキシブチニン塩酸塩 Oxybutynin hydrochloride
含有量 (1枚中)	オキシブチニン塩酸塩 73.5mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、過活動膀胱治療剤と呼ばれるグループに属する貼り薬です。
- ・この薬は、皮膚を通して少しずつ体内に吸収され、膀胱に作用して尿意切迫感や頻尿や尿失禁を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。

過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・尿閉（尿が出ない）の人
- ・閉塞隅角緑内障の人
- ・心臓に重篤な疾患がある人
- ・幽門、十二指腸または腸管が閉塞している人および麻痺性イレウスのある人
- ・胃アトニーまたは腸アトニーのある人
- ・重症筋無力症の人
- ・過去にネオキシテープに含まれる成分で過敏症のあった人
- ・授乳中の人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・下部尿路閉塞疾患（前立腺肥大症など）にかかっている人
- ・甲状腺機能亢進症の人
- ・うっ血性心不全の人
- ・不整脈のある人
- ・潰瘍性大腸炎の人
- ・高温環境にある人
- ・肝臓に重篤な障害のある人
- ・腎臓に重篤な障害のある人
- ・パーキンソン症状または脳血管障害のある人
- ・認知症または認知機能（記憶力、判断力、計算力等）障害のある人
- ・高齢の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の使う量および回数は、次のとおりです。



貼る回数	1日1回 毎日ほぼ同じ時間に（24時間毎に）貼り替えます。
1回量	1枚



●どのように使用するか？

- ・皮膚症状があらわれることがあるので、貼る場所を毎回変えてください。
- ・下腹部、腰部または大腿部のいずれかに貼ってください。
- ・ベルトなどがあたる場所は避けて貼ってください。
- ・傷や皮膚病のある場所には貼らないでください。
- ・あらかじめ貼る場所の水分や汗を十分に拭き取ってください。
- ・入浴などの時間を考慮して貼り替えてください。

<貼り方>

- ・この薬を貼り替える時は、前日に貼った薬をはがしてから、新しい薬を貼ってください。

	<p>①開け口からミシン目にそって切り取り、開封し、薬を取り出します。</p>
	<p>② 緑色で「ここからはがす」と書かれた透明フィルム面を上にして、フィルム中央から折り返し、片方のフィルムをずらし、粘着面を少し出します。</p>


	<p>③ 貼る場所に粘着面をあて、フィルムをずらしながら貼ります。</p>
	<p>④ もう一方も折り返して、フィルムをずらしながら貼ります。</p>

● 場所をかえて貼りかえる例



1回目の貼る場所は下腹部、2回目の貼る場所は腰というように、原則、場所をかえて貼ってください。4回目以降も違う場所に貼りかえてください。

● 同じ場所の中で位置をかえる例



同じ場所の中で貼りかえる場合は、貼りかえるごとに貼る位置を必ずかえてください。

●はがれた場合の対応

薬が途中ではがれた場合は、すみやかに新しい薬を貼ってください。次の貼り替えはいつもと同じ時間にしてください。

●貼り忘れた場合の対応

貼り忘れや貼り替えていないことに気付いた場合でも、一度に2回分を貼らないでください。気付いたらすぐに貼り替えて、次回からはいつもと同じ時間に貼り替えてください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

尿閉（尿が出ない）、散瞳（物が見えにくい、まぶしい）、興奮、頻脈（胸がドキドキする、めまい、動悸）などの症状があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合は、薬をはがし、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・目の調節障害（視力障害、目がかすれるなど）、めまい、眠気がおこったりすることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に注意してください。
- ・下部尿路閉塞疾患（前立腺肥大症など）の人は、使用前に残尿量測定が行われ、使用中も必要に応じて、検査が行われることがあります。
- ・皮膚症状があらわれることがありますので、貼る場所を毎回変えてください。異常を感じたら、薬をはがし、医師に連絡してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳中の人は授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
血小板減少 けっしょうばんげんしょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、 出血が止まりにくい
麻痺性イレウス まひせいイレウス	便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐、お腹が張る
尿閉 にょうへい	尿が出にくい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
顔面	鼻血
口や喉	吐き気、嘔吐、歯ぐきの出血
腹部	お腹が張る
皮膚	あおあざができる
便	便やおならが出にくい
尿	尿が出にくい
全身	出血が止まりにくい

【この薬の形は？】

販売名	ネオキシテープ 73.5mg	
薬袋		
形状	<p><支持体側></p>	<p><ライナー側></p>
大きさ	73.0mm×73.0mm	
色	淡褐色～褐色（支持体）、半透明（膏体）	
におい	特異なにおいがある	
識別コード	HP3191T	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	オキシブチニン塩酸塩
添加物	香料（フェニルエチルアルコール）、脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他 4 成分

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・この薬を使用するまでは包装を開けずに保管してください。
- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・開封後は開封口のチャックをしめて保管し、開封日より14日を越えたものは使用しないでください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

●廃棄方法は？

- ・接着面を内側にして折りたたみ、子供の手および目の届かない所に廃棄してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：久光製薬株式会社（<http://www.hisamitsu.co.jp/>）

お客様相談室

電話：0120-133250

受付時間／9:00－17:50（土日・祝日・会社休日を除く）