

製造番号

使用期限

第2類医薬品



「小児用」感冒薬

ハイリコテ[®]液

ZENEL

「小児用」

30mL

感冒薬

ハイ

リコテ[®]液



非ピリン

葛根湯

エキス配合

第2類医薬品

店舗専用

△ 使用上の注意

☒ **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人、本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人は服用しないで下さい。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）3. 服用後は乗物等の運転をしないで下さい（眠気があらわれることがあります）。4. 服用時は飲酒しないで下さい。5. 長期連用しないで下さい。

☒ **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。（1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。（3）高齢者。（4）本人又は家族がアレルギー体質の人。（5）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。（6）次の症状のある人。高熱、排尿困難（7）次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
（1）服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難



4 962721 103919



第2類医薬品

「小児用」感冒薬 ハイリココデ®液

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなりません。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。口のかわき

効能又は効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法及び用量

3才以上7才未満 1回 2.5mL、1才以上3才未満 1回 1.8mL、6ヵ月以上1才未満 1回 1.5mL 1日3回食後および必要な場合には就寝前に服用するものとし、また、場合によっては、1日6回まで服用することとしても差し支えないが、1日6回服用する場合には原則として約4時間の間隔をおいて服用して下さい。*(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。(4)6ヵ月未満の乳児には服用させないで下さい。(5)漢方エキス配合のため生薬成分の沈殿が生じますので、振ってから服用して下さい。

成分及び分量(30mL中)

カッカントウエキス(乾燥) 1700mg
(カッコン 2.472g、マオウ 1.236g、
タイソウ 1.236g、ケイヒ 0.928g、
シャクヤク 0.928g、カンゾウ 0.618g、
ショウキョウ 0.310gの混合生薬より
カッカントウエキス(乾燥) 1700mg
を得る) アセトアミノフェン314mg、
クロルフェニラミンマレイン酸塩4mg、
カフェイン水和物40mg
添加物：白糖、D-ソルビトール、エタノール、安息香酸Na、パラベン、香料

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気のない涼しい所に密栓して保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先 ☎06-6352-2381
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元 ゼネル薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 ゼネル薬工粉河株式会社
和歌山県紀の川市粉河840番地