

第2類医薬品



「小児用」感冒薬

ハイリコデ液

ZENEL

「小児用」

30mL
感冒薬

ハイ
リコデ液



非ピリン

葛根湯
エキス配合

第2類医薬品

△ 使用上の注意

×してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人、本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してせんそくを起こしたことがある人は服用しないで下さい。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（肺炎用内服薬、重物酔い薬、アレルギー用薬等）3. 服用後は果物等の運転をしないで下さい（眠気等があらわれることがあります）。4. 服用前後は飲酒しないで下さい。5. 長期連用しないで下さい。

■ 相関すること

1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難(6) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

第2類医薬品

「小児用」感冒薬 ハイリコデ液

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アアナフィジー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすけ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステevens- ジョンソン症候群)、 剥離性皮膚炎 多形性	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、尿色茶、全身のたるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等があらわれ、これら急急にあらわれ、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと喘る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青ざめ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気力が落ちるくらゐとする。血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。口のかわき、眠気、45～60分服用しても症状があらわれ、眠気は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

効能又は効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、悪寒、発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛の痛み）の緩解

用法及び用量

3才以上7才未満 1回 2.5mL、1才以上3才未満 1回 1.8mL、6か月以上1才未満 1回 1.5mL、1日3回食後および必要な場合には就寝前に服用するものとし、また、場合によっては、1日6回まで服用することとしても差し支えないが、1日6回服用する場合には原則として約4時間の間隔を置いて服用して下さい。* (1) 用法・用量を厳守して下さい。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けてから服用させて下さい。(4) 6か月未満の乳児には服用させないで下さい。(5) 漢方エキス配合のため生薬成分の沈降が生じますので、振ってから服用して下さい。

成分及び分量 (30mL中)

カクツトウキス (乾燥) 1700mg (カクツ 2.472g、マウツ 1.236g、タインツ 1.236g、ケイヒ 0.928g、シヤクヤク 0.928g、カンツク 0.618g、ショウキョウ 0.310gの混合生薬よりカクツトウキス (乾燥) 1700mgを得る) アセトアミノフェン3414mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩4mg、カフェイン水和物40mg
添加物：白糖、ロシニトール、エタノール、安息香酸Na、リタリン、香料

保管及び取り扱ひ上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい箇所に保管して下さい。(2) 小児の手が届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先 ☎06-6325-2381
受付時間 9時～17時(土、日、祝日を除く)
発売元 ゼネラル薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号
ゼネラル薬品工業株式会社
和歌山山紀(株)市利河840番地

