

第2類医薬品



「小児用」感冒薬

ハイリコデ液

非ピリン ZENE

「小児用」 30mL 感冒薬

ハイリコデ液



第2類医薬品

葛根湯

エキス配合

発売元
ゼネラル薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目5番1号
お問い合わせ先 ☎06-6352-2381
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日も除く)
製造販売元
ゼネラル薬品粉何株式会社
松阪山形町の川市町840番地

△ 使用上の注意

☒してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人、本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人は服用しないで下さい。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー薬等)3. 服用後は乗物等の運転をしないで下さい(眠気等があらわれることがあります)。4. 服用前後は飲酒しないで下さい。5. 長期運用しないで下さい。

■ 相関すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)高齢者。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)次の症状のある人。高熱、排尿困難(6)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障2. 服用後、次の症状があらわれた場合は服用中止の可能性があるのを直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診察を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声がすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の迷走等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮剥離症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなる皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る。全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする。息苦しくなる。空咳、発熱等がみられ、これが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューとなる。息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青ざり、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、めまいが重くなることとする。血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のむくみ、腰痛(骨が痛む)、下痢等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増悪がみられた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。口のかわき、眠気、4. 5〜6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

第2類医薬品

「小児用」感冒薬 ハイリコデ液

効能又は効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法及び用量

3才以上7才未満 1回 2.5mL、1才以上3才未満 1回 1.8mL、6か月以上1才未満 1回 1.5mL、1日3回食後および必要な場合には就寝前に服用するものとし、また、場合によっては、1日6回まで服用することによって差支えないが、1日6回服用する場合には原則として約4時間の間隔を空けて服用して下さい。★(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3)2歳未満の乳幼児には、医師の診察を受けてから服用させることを優先し、服用を得ない場合にはのみ服用させて下さい。(4)6か月未満の乳児には服用させないで下さい。(5)漢方エキス配合のため生薬成分の沈殿が生じますが、振ってから服用して下さい。

成分及び分量(30mL中)

カクツトウエキス(乾燥) 1700mg
(カクツト 2.472g、マウツ 1.236g、タイソツ 1.236g、ケヒツ 0.918g、ショウヤク 0.928g、カンソツ 0.816g、ショウキョク 0.310gの混合生薬)の
カクツトウエキス(乾燥) 1700mg
を得る) アセアミノノフェン 314mg、
クロルフェニラミン酸塩 4mg、
カフェイン水和物 40mg
添加物 白糖、ロザリトール、エタノール、安息香酸Na、バブリン、香料

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。(2)小児の手の届かぬところに保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になり、品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

副作用救済制度 ☎0120-149-931



4 962721 103919

