



第2類
医薬品

赤玉入

非ピリン系

かせねつ
一効散

製造販売元 富山薬品株式会社

富山市四方西岩瀬石瀬175

品目番号 S55-94-93

成分・分量 1日量(3包中)

アセトアミノフェン……………450mg
サリチルアミド……………1,500mg
無水カフェイン……………100mg
dL-メチルエフェドリン塩酸塩……………30mg
ジフェンヒドラミンサリチル酸塩…75mg(赤玉丸剤)
添加物としてパラシヨデンプン、コメデンプン(丸剤)、タール
色素(丸剤)を含む 1包量(散剤850mg丸剤6粒)

用法・用量

15才以上(大人)……………1回 1包宛(丸剤6粒)
11才以上15才未満……………1回 $\frac{2}{3}$ 包宛(丸剤4粒)
8才以上11才未満……………1回 $\frac{1}{2}$ 包宛(丸剤3粒)
5才以上 8才未満……………1回 $\frac{1}{3}$ 包宛(丸剤2粒)
1日3回食後なるべく30分以内に服用して下さい。

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、
悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

使用上の注意

- 1)服用に際しては、添付の「使用上の注意書」を必ずお読み下さい。
- 2)15才未満の水痘、インフルエンザの患者さんには投与しないで下さい。
- 3)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人、本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人は服用しないで下さい。
- 4)小児の手の届かない所に保管し、他の容器に入れ替えないで下さい。
- 5)1包を分割したり、残りを使用する場合には、袋の口を折返し、2日以内に使用して下さい。又使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
- 6)直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。

2包入 ¥300+税

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



袋



分包