



第2類
医薬品

赤玉入
非ピリン系
**かぜねっ
一効散**

製造販売元 **富山薬品株式会社**
富山市四方西岩瀬石瀬175

品目番号 S55-94-93

成分・分量 1日量(3包中)

アセトアミノフェン……………450mg
サリチルアミド……………1,500mg
無水カフェイン……………100mg
dL-メチルエフェドリン塩酸塩……………30mg
ジフェンヒドラミンサリチル酸塩…75mg(赤玉丸剤)
添加物としてパラシヨデンプン、コメデンプン(丸剤)、タール
色素(丸剤)を含む 1包量(散剤850mg丸剤6粒)

用法・用量

15才以上(大人)……………1回 1包宛(丸剤6粒)
11才以上15才未満……………1回 $\frac{2}{3}$ 包宛(丸剤4粒)
8才以上11才未満……………1回 $\frac{1}{2}$ 包宛(丸剤3粒)
5才以上 8才未満……………1回 $\frac{1}{3}$ 包宛(丸剤2粒)
1日3回食後なるべく30分以内に服用して下さい。

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、
悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

使用上の注意

- 1)服用に際しては、添付の「使用上の注意書」を必ずお読み下さい。
- 2)15才未満の水痘、インフルエンザの患者さんには投与しないで下さい。
- 3)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人、本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人は服用しないで下さい。
- 4)小児の手の届かない所に保管し、他の容器に入れ替えないで下さい。
- 5)1包を分割したり、残りを使用する場合には、袋の口を折返し、2日以内に使用して下さい。又使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
- 6)直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。

2包入 ¥300+税

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



袋



分包

かぜねつ一効散

第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと。
 - (1) 本剤による過敏症状(発疹・発赤・かゆみ・浮腫等)を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛剤を服用してぜんそくを起こしたことがある人
 - (3) 5歳未満の乳幼児
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他のかぜ薬、解熱鎮痛剤、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気があらわれることがある)
4. 服用時は飲酒をしないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の人
 - (4) 高齢者
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (6) 薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (7) 次の症状がある人
高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

(裏面もお読みください。)

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・かゆみ
消 化 器	悪寒・嘔吐・食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診断を受けること

症状の名前	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり冷や汗、息苦しさ等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなるしない場合

3. 次の症状が現れることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
口のかわき

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない(湿気の少ない)涼しい所に(密封して)保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元
富山薬品株式会社
富山市四方西岩瀬石瀬175