

かぜピラシリンゴールドK

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	かぜ薬（内用）
承認販売名	
製品名	かぜピラシリンゴールドK
製品名（読み）	カゼピラシリンゴールドK
製品の特徴	
使用上の注意	<p>■してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり，副作用・事故が起こりやすくなる）</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないこと <ol style="list-style-type: none"> 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 本剤又は他のかぜ薬，解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 本剤を服用している間は，次のいずれの医薬品も使用しないこと 他のかぜ薬，解熱鎮痛薬，鎮静薬，鎮咳去痰薬，抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬，乗物酔い薬，アレルギー用薬等） 服用後，乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。） 服用前後は飲酒しないこと 長期連用しないこと <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること <ol style="list-style-type: none"> 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 妊婦又は妊娠していると思われる人。 授乳中の人。 高齢者。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 次の症状のある人。 高熱，排尿困難 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害，糖尿病，心臓病，高血圧，肝臓病，腎臓病，胃・十二指腸潰瘍，緑内障 服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること <p>[関係部位：症状] 皮膚：発疹・発赤，かゆみ</p>

消化器：吐き気・嘔吐，食欲不振
 精神神経系：めまい
 泌尿器：排尿困難
 その他：過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

[症状の名称：症状]

ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに，皮膚のかゆみ，じんましん，声のかすれ，くしゃみ，のどのかゆみ，息苦しさ，動悸，意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群），中毒性表皮壊死融解症，急性汎発性発疹性膿疱症：高熱，目の充血，目やに，唇のただれ，のどの痛み，皮膚の広範囲の発疹・発赤，赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る，全身がだるい，食欲がない等が持続したり，急激に悪化する。

薬剤性過敏症症候群：皮膚が広い範囲で赤くなる，全身性の発疹，発熱，体がだるい，リンパ節（首，わきの下，股の付け根等）のはれ等があらわれる。

肝機能障害：発熱，かゆみ，発疹，黄疸（皮膚や白目が黄色くなる），褐色尿，全身のだるさ，食欲不振等があらわれる。

腎障害：発熱，発疹，尿量の減少，全身のむくみ，全身のだるさ，関節痛（節々が痛む），下痢等があらわれる。

間質性肺炎：階段を上ったり，少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる，空せき，発熱等がみられ，これらが急にあらわれたり，持続したりする。

ぜんそく：息をするときゼーゼー，ヒューヒューと鳴る，息苦しい等があらわれる。

再生不良性貧血：青あざ，鼻血，歯ぐきの出血，発熱，皮膚や粘膜が青白くみえる，疲労感，動悸，息切れ，気分が悪くなりくらっとする，血尿等があらわれる。

無顆粒球症：突然の高熱，さむけ，のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後，次の症状があらわれることがあるので，このような症状の持続又は増強がみられた場合には，服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
 口のかわき，眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

<p>効能・効果</p>	<p>かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み）の緩和</p>
<p>効能関連注意</p>	
<p>用法・用量</p>	<p>いずれも，1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。 15歳以上：1回：1包 11歳以上15歳未満：1回：2／3包 7歳以上11歳未満：1回：1／2包 3歳以上7歳未満：1回：1／3包 1歳以上3歳未満：1回：1／4包 1歳未満：服用しないこと</p>

<p>用法関連注意</p>	<p>(1) 用法及び用量を厳守してください。 (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。</p>																					
<p>成分分量</p>	<p>1日量(3包)中</p> <table border="1" data-bbox="544 338 1485 972"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> <th>内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>900.0mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>7.5mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ノスカピン</td> <td>48.0mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dl-メチルエフエドリンサツカリン塩</td> <td>60.0mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>75.0mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>桂枝湯乾燥エキス</td> <td>300.0mg</td> <td>(ケイヒ・シャクヤク・タイソウ各800mg, カンゾウ400mg, ショウキョウ200mg)</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	内訳	アセトアミノフェン	900.0mg		クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg		ノスカピン	48.0mg		dl-メチルエフエドリンサツカリン塩	60.0mg		無水カフェイン	75.0mg		桂枝湯乾燥エキス	300.0mg	(ケイヒ・シャクヤク・タイソウ各800mg, カンゾウ400mg, ショウキョウ200mg)
成分	分量	内訳																				
アセトアミノフェン	900.0mg																					
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg																					
ノスカピン	48.0mg																					
dl-メチルエフエドリンサツカリン塩	60.0mg																					
無水カフェイン	75.0mg																					
桂枝湯乾燥エキス	300.0mg	(ケイヒ・シャクヤク・タイソウ各800mg, カンゾウ400mg, ショウキョウ200mg)																				
<p>添加物</p>	<p>乳糖水和物, 白糖, カルメロースカルシウム, ヒドロキシプロピルセルロース, D-マンニトール, 結晶セルロース, サッカリンナトリウム</p>																					
<p>保管及び取扱い上の注意</p>	<p>(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。) (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。 (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。</p>																					
<p>消費者相談窓口</p>	<p>会社名：大協薬品工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談窓口 電話：076-479-1313 受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）</p>																					
<p>製造販売会社</p>	<p>大協薬品工業（株） 会社名：大協薬品工業株式会社 住所：富山市水橋畠等173</p>																					
<p>販売会社</p>																						
<p>剤形</p>	<p>散剤</p>																					
<p>リスク区分等</p>	<p>第「2」類医薬品</p>																					